MAXIGIB®

(Acido Giberelico)

Regulador de crecimiento de Plantas

Tabletas solubles (ST)

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.
No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.

PRIMEROS AUXILIOS

El Acido Gilberélico es considerado como inócuo (no tóxico), pero en caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.

NOTA AL MEDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sosten.
DL/50 del producto formulado
Aguda oral > 15000 mg/Kg.
Aguda dermal >2000 mg/Kg.

ANTÍDOTO

No hay antídoto especifico

CUADRO DE DOSIFICACIONES
USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO

CULTIVOS	Dosis Tab. X 200 L	ÉPOCA DE APLICACIÓN	U.A.C (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	2 a 4	Aplicar en forma dirigida a los racimos florales y frutos pequeños para inducir mayor cuajado y tamaño de frutos.	15	0.15
Papa	2 a 4	Para interrumpir la inactividad o la latencia de los tubérculos y estimular el bromatimiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos.	15	0.15
Vid	5 a 8	Aplicar sobre los racimos de vid al inicio de la apertura de flores.	15	0.15
Alfalfa	2 a 4	Para incrementar el crecimiento y producción, aplicar 15 días después del corte en cultivo mayor de un año.	15	0.15

UAC: Última Aplicación antes de la Cosecha (días) LMR : Límite Máximo de Residuos (ppm)

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las instrucciones dadas.

INDICATIVOS DE USO

MAXIGIB es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce a la floración, disminución de la caída de los frutos, regula la maduración de frutos, produce interrupción de la latencia en las semillas, tubérculos y bulbos.

PREPARACION Y APLCACION

Llenar el tanque con el volumen de agua requerida, agregar la cantidad necesaria de tabletas de **MAXIGIB** agitar y proceder a su uso total de la mezcla el mismo día.

COMPATIBILIDAD

MAXIGIB es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

LIGERAMENTE TOXICO - PRECAUCION

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO

MAXIGIB®
(Acido Giberelico)
Regulador de crecimiento de Plantas
Tabletas solubles (ST)

MAXIGIB®
(Acido Giberelico)
Regulador de crecimiento de Plantas
Tabletas solubles (ST)

COMPOSICION QUIMICA

Ingrediente activo:
Acido Giberélico ..... 125.00 g/kg.
Ingredientes Inertes ..... 875.00 g/kg.

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Reg. PBUA N° 122-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
PINERAL ANDINA
Avenida Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia
II Etapa La Molina. Lima-Perú.
Teléfono 348-1018 / Telefax 349-9609

FORMULADO Y FABRICADO POR:
Saxon Technologies Ltd.
Trident House, Clare Road
Stanwell, Middlesex TW 19 7QU
Inglaterra

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.
Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis.
Lima, Perú. Teléfono: 5470638

Número de lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

Contenido Neto: 10 Tabletas

LIGERAMENTE TOXICO - PRECAUCION

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO

MAXIGIB®
(Acido Giberelico)
Regulador de crecimiento de Plantas
Tabletas solubles (ST)