

Tamaño: 16 x 12 cms

10.12.2017

BENAXIL® 73

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Benaloxyl	80.00 g/kg
Mancozeb	650.00 g/kg
Etilentiores (ETU)	0.38 g/kg
Aditivos	270.00 g/kg

PQUA N° 22-SENASA

Titular Del Registro: SERFI S.A.

Formulador:
FARMEX S.A.
Av. Santa Josefina 467
Urb. Las Vegas
Puente Piedra
Lima - Perú

Importado y Distribuido por:

Serfi SA
Av. Oscar R. Benavides (ex-Diagonal)
N° 380 Of. 701, Miraflores Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 446-2886

Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comar, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese bien la ropa contaminada y lávese con abundante agua jabonosa.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferrejos.
- No reanudar el consumo en otros envases ni envases.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite la inhalación moderada a los ojos.
- El producto no puede ser usado en presencia de personas que mantengan actividades para esportar, especialmente ferozmente.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas o ciertas enfermedades.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de enfermedades.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llame al médico al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, láveselos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón. En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CETOPE: Tel. 272-2318, 800 719111
ESALUD: 411-4000 (opción 4)

- En caso de ingestión provocar el vómito luego de ingerir, purgarlos salinos y curar sintomáticamente.
- En caso de inhalación no dar de beber leche ni bebidas azucaradas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la basura de aplicación y luego insúlalo vitreado o perforado y depositado en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No disponga los envases en vertederos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Es peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No aplicar a menos de 2 metros de fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DEL USO Y MANEJO:
Es un fungicida de actividad sistémica y de contacto con acción preventiva y curativa para el control de "Oomicosis". Una característica de BENAXIL 73 es su capacidad de actuar al interior de los tejidos de los diversos órganos de las plantas al ser absorbido por los yemas, hojas, ramas, herbáceas y raíces de las plantas. Su comportamiento endotérmico le permite actuar en el interior de los tejidos de las plantas, además de actuar contra los patógenos en la superficie de los órganos de las plantas. No usar en ambientes cerrados como invernaderos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene de agua el recipiente hasta un tercio del mismo y agregue la dosis recomendada y agite bien. Luego, una suspensión homogénea. Por último complete con agua al recipiente y continúe el trabajo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede aplicarse cuando las condiciones ambientales favorezcan la infección de las plantas por el patógeno. Se puede aplicar hasta dos veces por campaña hasta 4 veces por año con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

La aplicación se realiza con equipos terrestres como pulverizadores de palanca o aquellos acoplados a tractores. El gasto promedio es de 600 litros por hectárea en los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con químicos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que los característicos físico-químicos del producto contenido en este envase corresponden a los indicados en la etiqueta y que es eficaz para las fines a que recomienda, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	Hielo fungoso o rancho	Phytophthora infestans	2.50	28	1
Tomate	Hielo fungoso o rancho	Phytophthora infestans	1.50	28	1
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor cubensis	1.00 - 2.00	28	1
Zapallo	Mildiu	Pseudoperonospora cubensis	1.25 - 1.50	28	1
Papaína	Pudrición tallo y frutos	Phytophthora capsici	1.00	15	1
Vid	Mildiu	Plasmopara viticola	1.0 - 1.5	28	1

