

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- El producto es moderadamente irritante para los ojos, a la piel o el aparato respiratorio.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con la piel y ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Acetanilidas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CICOTOX: 0800-13040 CIPROSQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 117

MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar a menos de 10 m de efluentes de agua.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para las abejas

MARISCAL 60 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Butachlor..... 600 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 041 - SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336-5428

FABRICADO POR: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Domicilio: Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P. R. China

N° de lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 1 L, 4 L y 20 L



EXPLOSIVO



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MARISCAL 60 EC es un herbicida pre-emergente, sistémico, que se utiliza para control de malezas de hojas anchas, gramíneas y ciperáceas anuales. Posee buen poder residual que permite controlar por varias semanas, especialmente en los momentos críticos de competencia de malezas que son las primeras etapas de desarrollo del cultivo de arroz.

Arroz de trasplante: Después del trasplante aplicar con botella. La aplicación es preferible hacerla con una pequeña lámina de agua o en seco, siempre y cuando se tenga humedad en el suelo. Esta debe hacerse la primera semana después del trasplante antes que emerjan las malezas, después rellenar las pozas y mantenerlas sin desaguar por lo menos de 5 a 7 días. Aplicaciones con malezas muy crecidas puede dificultar el control, por lo que es recomendable hacer la aplicación siempre antes que emerjan las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADROS DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz (trasplante)	Malezas gramíneas y ciperáceas: Pata de gallina Chapatolla Moco de pavo Canastilla	<i>Eleusine indica</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cyperus diformis</i>	3 - 4	(*)	0.5
	Malezas de hoja ancha: Verdolaga Campanilla	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Ipomoea sp.</i>	4	(*)	0.5

PC: Periodo de Carenza en días.

LMR: Limite Máximo de Residuos expresados en ppm.

(*): MARISCAL 60 EC no tiene PC, porque se aplica una sola vez en la época de trasplante.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por campaña agrícola, en pre-emergencia de malezas

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MARISCAL 60 EC por su forma de aplicación no debe mezclarse con ningún fertilizante, fungicida ni insecticida siendo compatible con otros herbicidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

