

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
No aplicar en dirección contraria al viento.
Uselo de sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave.
Usar máscara, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.
No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas) bebidas, forrajes ni medicinas.
Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ketonoles
Retirar las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón. No usar solventes. En caso de ingestión oral inducir al vómito cuando el paciente está consciente. Dar de beber mucho líquido en unas pocas horas para forzar la diuresis.
Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos por 15 minutos.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847
SAMU: 106 BAYER S.A: 2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua.
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
Aplique el producto como se indica en la etiqueta.
Mantener una banda de No aplicación de 3 metros hacia fuentes de agua.
Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques y flora silvestre.
No permita el ingreso de animales al área tratada.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Spiromesifen, 240 g/l
Aditivos, csp 1 litro

Reg. PQUA N° 50-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Fabricado y formulado por:
Bayer CropScience AG
D-51368
Leverkusen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Telf.2113800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto: 1 litro**

Lote N.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Oberon 240 SC es un moderno insecticida que pertenece al nuevo grupo de los ketoenoles, con efecto traslaminar y de contacto. Tiene alta actividad sobre huevos y ninfas de mosca blanca.

Agítese bien antes de usar. Grupo IRAC:23

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (1)		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l/ha	%		
Páprika	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	0.4-0.6	--	3	0.3
Papa	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.5-0.6	--	7	0.02
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	0.4-0.6	--	7	0.3
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.6	--	3	2
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.5-0.6	--	20	0.02
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	--	0.05-0.06	90	0.02
Arroz	Acaro de la vaina	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	0.25	--	N.a	0.02
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	--	0.06-0.07	64	0.02

*P.C: Periodo de carencia (días) ** LMR: Limite máximo de residuos (ppm)

(1) Volumen de agua recomendado de 400-500 l/ha, para aplicaciones terrestres con pulverizadora manual de mochila. Para el cultivo de arroz, el producto se aplica al encontrarse el cultivo en "punto de algodón".

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

En el cultivo de arroz, la aplicación se debe realizar cuando el cultivo se encuentre en "punto de algodón", el tiempo promedio que transcurre hasta la cosecha es de 80 días, considerar una aplicación/campaña/año. En vid aplicar cuando el cultivo tenga brotes de más de 30 cm.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones. En vid, se recomienda no mezclar con otros productos ni coadyuvantes.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados, sin embargo es conveniente realizar pruebas de compatibilidad en variedades susceptibles y plantas en etapa de vivero.

Responsabilidad civil:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.”



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 286 C y Pantone 368 C