

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES: Manipuleo-Almacenaje-Transporte
Durante su manipuleo use ropa, máscara y guantes protectores. Evitar el contacto con la piel e inhalar al momento de la aplicación. Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación. No comer ni fumar durante la aplicación luego lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa. No aplicar en dirección contraria al viento. No verter el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias). Usarlo de su envase original y almacenélo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas. Evitar el contacto de aves con el producto aplicado.

PRIMEROS AUXILIOS:
Acudir de inmediato al médico, entretanto, hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, no desabrigarlo, lavar las partes expuestas al contacto.
En caso de ingestión oral se da a beber mucha agua (no dar leche ni alcohol) y una suspensión de carbón medicinal de 10 mg en 150 a 200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejora del paciente. Inducir el vómito sólo si el paciente está consciente. Dar de beber mucho líquido para forzar la diuresis. En caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

ANTIDOTO: No se ha determinado un antídoto específico.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:
El médico instituirá un tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION
CICOTOX: 0800-1-3040 **CISPROQUIM:** 0800-50847

MANEJO DE ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

No disponer con residuos municipales, no reutilice los envases destrúyalos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

Aplique el producto como se indica en la etiqueta.

Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No aplicar en épocas de floración del cultivo objetivo o de los cultivos colindantes.

Peligroso para abejas y fauna benéfica.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Imidacloprid, 350 g/L
Aditivos, 800 g/L

Reg. PQUA N° 74-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
16 rue Jean Marie Leclair
CP 106
69266 Lyon - Cedex 09
Francia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 San Isidro
Lima - Perú

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Insecticida sistémico del grupo de los cloronicotinilos. Tiene efecto de contacto estomacal e ingestión. Nuevo modo de acción contra poblaciones de insectos resistentes a insecticidas piretroides y fosforados.

Preparación de la mezcla: Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua limpia, agregar la dosis recomendada para cada plaga cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Aplicación al follaje

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	%	L / ha	ml/cil		
Algodón	Pulgón de primavera	<i>Aphis gossypii</i>	-	0.075 0.12	75 120	14	6
	Pulgón en Algodón maduro (Piura, Lambayeque) Pulgón de verano		-	0.3	200-300		
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	-	0.3	200-300		
Mandarina	Minador de hoja de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	-	-	50- 100	30	1.0
Naranja	Pulgón	<i>Toxoptera aurantii</i>	-	-	100		
Mandarina	Mosca Blanca	<i>Aleurotrixus floccosus</i>	-	-	100		
Limonero	Quereza coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	-	-	140	3	0.05
	Quereza redonda	<i>Selenaspis articulatus</i>	-	-	140		
Espárrago	Mosquilla de los brotes o Cecidómido	<i>Prodiplosis longifolia</i>	-	0.3	150		
Tomate			-	-	200	n.a	n.a
Ají			-	0.5	-		
Papa			-	-	-		
Mangold			-	-	-		
Arroz	Sogata	<i>Sogatodes orizicola</i>	-	0.1- 0.15	50 - 75	21	0.2
Frijol	Cigarritas	<i>Empoasca fabae</i>	-	0.16	80	14	0.5
Vid	Filoxera	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	-	-	100	21	1.0
Arándanos	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juliae</i>	0.1	-	-	3	3.5
		Utilización en trampas					
Mango	Mosca de la fruta	<i>Anastrepha spp.</i>	-	-			

* PC = Periodo de carencia (días) **LMR= Limite Máximo de Residuos (ppm) n.a = No aplica

Aplicaciones al suelo tipo “drench” y al sistema de riego por goteo.

Cultivo	Nombre Común	Nombre Técnico	Dosis	Método	PC* (días)	LMR** (ppm)
Tomate	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.75-1.0 / ha	Aplicar el caldo del insecticida en “drench” 100 ml directamente a la zona de la raíz en cada golpe siembra llegando a la dosis de	3	0.05
Ají	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>		En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar	3	0.05
Pimiento					3	0.05
Vid	Filoxera	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	1.5 / ha	En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar	21	1.0
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis sp.</i>	1.5 / ha		3	0.05
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>				
Mandarina	Minador de las hojas de los cítricos.	<i>Phyllocnistis citrella</i>	1 cc. de Confidor por año planta en campo definitivo desde el trasplante hasta los 3 años.	Diluir la cantidad necesaria de Confidor en 2 a 3 litros de agua y aplicar la dilución hasta humedecer bien el área radicular.	30	1.0

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Aplicar previa evaluación y según nivel de daño económico. No aplicar en periodos de floración ya que puede ser tóxico a abejas. Se recomienda tres aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones. ¡AGITAR BIEN ANTES DE USAR!

PRECAUCION: No mezclar con abonos foliares.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

“El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.