

Pantone 281 Pantone 293
 Pantone 347 Pantone Black

30 x 15 cms

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a 0 °C ó superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; ingresar al área tratada después que se seque la nube de aspersión (24 horas).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Irritante a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Sensibilizante al contacto con la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel.
- Irritante al tracto respiratorio por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ftalonitrilo.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.**
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado diluido en agua. No inducir al vómito.

NOTA AL MEDICO

- En personas inconsciente no administrar nada por vía oral.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación de al menos 5 m de fuentes de agua.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos y fauna silvestre.
- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Bravo[®] 720 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Clorotalonil720 g/L
 Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°: 075 - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
 Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú
 RUC: 20501511740
 Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por :



Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima
 Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516
 RUC: 20100180210

Formulado por:
 Syngenta S.A.
 Vía Mamonal, Km 6
 Cartagena, Colombia

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Lote No. :

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de producto que contienen ® o ™,
 El logo SYNGENTA y el marca CP FRAME
 Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Contenido Neto:

1 Litro



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Bravo 720 SC** es un fungicida preventivo con acción de contacto.
- Antes de abrir el envase de **Bravo 720 SC**, agitarlo fuertemente.
- Para la preparación, llenar el cilindro con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **Bravo 720 SC** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
- **Bravo 720 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- **Bravo 720 SC** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	P. C. (días)	L. M. R. (ppm)
Aji paprika	alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	400 - 500	12	0,01
Arveja	antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	500	1	0,01
Cebolla	mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	350	7	0,5
	Tizon foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	350 - 500		
	roya	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500		
Esparrago	cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	350 - 400	30	0,01
	mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 500		
	alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	250 - 300		
Marigold	alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	400 - 500	N.A	N.A
Papa	rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0,01
	alternariosis	<i>Alternaria solani</i>			

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Para obtener un control óptimo y económico **Bravo 720 SC** debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 5 y 7 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.
- Realizar un máximo de dos aplicaciones de **Bravo 720 SC** por campaña.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda incluir a **Bravo 720 SC** en un programa de manejo de las enfermedades con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al área tratada tan pronto se seque la nube de aspersión (24 horas).

COMPATIBILIDAD

- **Bravo 720 SC** no debe combinarse con plaguicidas, surfactantes o fertilizantes, a menos que la experiencia muestre que la combinación es físicamente compatible, efectiva y no causa daños al cultivo en el que se va a utilizar.
- **Bravo 720 SC** no debe ser mezclado con aceites o aplicado a cultivos que hayan sido tratados con aceite en por lo menos 10 días. No se debe aplicar aceite a cultivos tratados con **Bravo 720 SC** por al menos 10 días después de la última aplicación. Bajo algunas circunstancias, ciertos surfactantes pueden causar daño a las plantas.

FITOTOXICIDAD

- Siguiendo las recomendaciones de uso **Bravo 720 SC** no causa fitotoxicidad en ninguno de los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

