

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es moderadamente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cloroacetamida.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una "banda de no aplicación" de al menos 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera del área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Evitar que la deriva de la aplicación alcance cultivos no objetivo.



HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Butaclor 600 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 098-SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Tel.: (01) 617-3300
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing
 China.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 L**

F. de Form:
 N° Lote:
 F. de Venc:



NO INFLAMABLE



CORROSIVO

EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ARROBA® 600 EC** es un herbicida pre-emergente y post-emergente temprano, sistémico, que se utiliza para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas y ciperáceas anuales. Posee buen poder residual permitiendo el control por varias semanas; especialmente en los momentos críticos de competencia de malezas en la primera etapa de desarrollo del cultivo de arroz.
- En siembra directa: aplicar **ARROBA® 600 EC** después de la siembra del arroz; se recomienda tener pozas bien preparadas, niveladas y con una lámina de agua permanente. En arroz de transplante: aplicar **ARROBA® 600 EC** cuando el arroz se encuentre con tres días de transplante y antes de la emergencia de las malezas (en malezas muy crecidas puede dificultar el control). **ARROBA® 600 EC**, puede ser aplicado con bomba de mochila manual o a motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Realizar la aplicación con una pequeña lámina de agua, o en seco, siempre y cuando el suelo este húmedo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
ARROZ	"Moco de pavo" "Campanilla" "Pata de gallina" "Coquito" "Florcita" "Chapatolla" "Flor de agua" "Sara-Sara" "Palo de agua"	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Ipomoea</i> spp. <i>Eleusine indica</i> <i>Cyperus difformis</i> <i>Eclipta alba</i> <i>Echinochloa colona</i> <i>Ludwigia</i> spp. <i>Commelina fasciculata</i> <i>Ammania coccinea</i>	1.5 - 2.0	3 - 4	ND	0.1

PC: Periodo de carencia

ND: No determinado.

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación después de la siembra: con el riego de germinación (en siembra directa) o después del transplante.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

ARROBA® 600 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con ácidos fuertes y materiales alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

ARROBA® 600 EC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

