27.0 cm

37.0 cm

POLVORIN 75 PM®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN
Chlorothalonil ..... 750 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N°110 - SENASA

"VENTA SOLO CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu; 214217 China
Tel (86-510) 8785 1001

Contenido neto: **1 kg**
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por inhalación, ingestión y contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo químico: Cloronitrilo.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito (si es que la persona estuviese consciente).
- No dar de beber nada a una persona que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación, se deberá dar tratamiento sintomático.
- **En caso de emergencias llamar a:**
  CICOTOX Telf.: 328 7700
  ESSALUD: 411 8000 opción 4
  CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido destruya este envase y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
POLVORIN 75 PM es un fungicida de amplio espectro para tratamientos preventivos y curativos en diferentes cultivos como hortalizas y otros.
Para su aplicación, mezclar con agua la cantidad necesaria de Polvorin 75PM, aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestres, tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.
Las aplicaciones foliares deben de ser preventivas cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
POLVORIN 75 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo.
Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 2 semanas.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
POLVORIN 75 PM es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
POLVORIN 75 PM no es fitotóxico a los cultivos y dosis indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	g/200L		
Alcachofa	"Tizón temprano"	*Alternaria solani*	1.8 - 2.4	600 - 800	1	0.01
Apio	"Viruela del apio"	*Septoria apii*	2.4	800	7	15
Cebolla	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	2.1	700	14	0.5
Espárrago	"Cercospora"	*Cercospora asparagi*	1.8 - 2.4	600 - 800	15	0.1
Marigol	"Tizón temprano"	*Alternaria sp.*	1.8	600	7	5
Melón	"Moho gris"	*Botrytis cinerea*	1.8	600	7	5
Papa	"Tizón temprano"	*Alternaria solani*	2.1	700	3	0.1
Paprika	"Moho gris"	*Botrytis cinerea*	1.8 - 2.1	600 - 700	7	0.01
Tomate	"Hielo o Rancha"	*Phytophthora infestans*	2.1	700	3	5

PC: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos (partes por millón) **N.d:** No determinado