

- Pantone 2747

Pantone yellow


Pantone 199

Cyan
- Pantone 347

Pantone Black

Pantone 534

30 x 15 cms



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni Forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35°C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Es moderadamente irritante a la piel y a los ojos por lo que se debe evitar la exposición prolongada del producto con la piel y a los ojos.
- Evitar la ingestión del producto.
- Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol
 - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta,
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
 - En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
 - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
 - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
 - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
 - En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.**
- MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**
- No disponer con residuos municipales.
 - Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE.

- Altamente toxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, rios, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Topas® 100 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición

Penconazole100 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Registro N° 015-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú
RUC: 20501511740

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876
Importado y Distribuido por :
TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima- Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981
Formulado por:
Syngenta S.A.
Cartagena, Colombia.

Lote No.:

Fecha de Form.:

Contenido Neto: 1 Litro

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contienen ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP INRAE
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPAS 100 EC es unfungicida con propiedades fungicidas y curativas para el control de oidio en varios cultivos. Pertenece al grupo de los triazoles, inhibidores de la síntesis del ergosterol.

TOPAS 100 EC debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación provisto de boquillas adecuadas (cónicas).

Preparación del caldo:

Disuelva aparte la dosis de TOPAS 100 EC a utilizar con la cantidad suficiente de agua que permita conseguir una solución uniforme y sin grumos. Agitar bien. Viértase en el tanque del equipo o cilindro de preparación y completar el volumen de agua determinada para la aplicación agitando o removiendo bien para mantener la suspensión uniforme. En caso utilic e un surfactante no iónico, añádalo al final y vuelva a agitar.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (cc / 200 L)	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Zapallo, Melón, Pepinillo, Sandía Tabaco	Oidium	Erysiphe cichoracearum	100 - 120	3	0.20
				14	0.10
Manzano, Peral	Oidium	Podosphaera leucotricha		14	0.20
Melocotonero	Oidium	Sphaerotheca pannosa var. persicae		7	0.20
Vid	Oidium	Uncinula necator		30	0.20
Frijol, Vainita, Arveja	Oidium	Erysiphe polygoni		7	0.20
Rosas	Oidium	Sphaerotheca pannosa var. rosae		7	0.01
Fresa	Oidium	Podosphaera macularis		7	0.10
Mango	Oidium	Oidium mangiferae		30	0.01
Tomate	Oidium	Oidium balsamii		10	0.20
Papa	Oidium	Oidium sp.		30	0.01
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	125 - 150	14	0.2
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150	30	0.20

P.C.: Periodo de Carenacia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para obtener un control óptimo de TOPAS 100 EC debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir las aplicaciones a intervalos de 10 - 15 días o de acuerdo a la presión del patógeno. Para evitar la aparición de resistencia se recomienda no aplicar TOPAS 100 EC más de dos veces consecutivas rotando siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TOPAS 100 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

Fitotoxicidad

TOPAS 100 EC apliado la dosis recomendada no muestra fototoxicidad en los cultivos recomendados.

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

