

26.3 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Triazina**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- CICOTOX: 0800 - 1 - 3040
- NEOAGRUM SAC: 617-6400
- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



RAYO<sup>®</sup> 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazina ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L  
N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Vénc.:

Formulado por:  
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED  
29 Xiaohang Road, Nanjing  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.

RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGAS                    |                      | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común              | Nombre Técnico       |               |                |                 |
| Maíz    | Lechera                   | Euphorbia spp.       | 6.0 - 8.0     | -              | 0.5             |
|         | Hierba mora               | Solanum nigrum       |               |                |                 |
|         | Paja paja o rabo de zorro | Setaria verticillata | 1.5 - 3.0     | 30             | 0.25            |
|         | Verdolaga                 | Portulaca oleracea   |               |                |                 |
|         | Yuyo                      | Ananarthus spp.      |               |                |                 |
| Sorgo   | Chamico                   | Datura stramonium    | 1.5 - 3.0     | 30             | 0.25            |
|         | Malagusanó                | Flaveria bidentis    |               |                |                 |
|         | Hierba de gallinazo       | Chenopodium spp.     |               |                |                 |
|         | Pata de gallina           | Elaeagnus indica     |               |                |                 |
|         | Amor seco                 | Bidens pilosa        |               |                |                 |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas
- No manipulear, mezclar, almacenar, ni transportar el producto en recipientes que hayan sido utilizados para otros fines
- No manipular o depositar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarla con abundante agua y jabón
- Beber abundante agua salada para inducir al vómito. No hacer ningún otro tipo de tratamiento. Aplicar el tratamiento sintomático
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-11-3040

NEO AGRUM SAC: 817-5400

MEIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vacíe la solución en la mezcla de aplicación, luego deseche el envase en un lugar autorizado para ello
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto

RAYO<sup>®</sup> 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Alifosac 500 g/L

Reg. N° 153-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:

NEOAGRUM SAC

neogrum

Calle Camarinas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima

Teléfono: 817-6601 / Fax: 817-6601

Contenido neto: 4 L

1 L de agua  
1 L de F. de F.  
1 L de F. de V.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por  
SINO-OROS-BIO-CECE-COPO LIMITED  
29, Kiating Road, Taining  
China

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
RAYO 500FW es un herbicida de acción sistémica que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.  
RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego viajar a la biomasa. No evita la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO        | Nombre Común                                      | PLAGAS                                                                       | Nombre Técnico | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(days) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Caña de azúcar | Lecherosa<br>Papa roja o rojo de zorro            | Euphorbia spp.<br>Sida spp.<br>Setaria verticillata                          |                | 8.0 - 8.0     | -              | 0.5             |
| Maíz           | Verdehaga<br>Tripe<br>Ceniza<br>Manguano          | Portulaca oleracea<br>Amaranthus spp.<br>Digitaria spp.<br>Flebotoma bolsona |                | 15 - 30       | 30             | 0.25            |
| Sorgo          | Hierba de galinazo<br>Pelo de gallina<br>Año seco | Chenopodium spp.<br>Eleusine indica<br>Bissia pilosa                         |                | 15 - 30       | 30             | 0.25            |

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con alta contenido de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno al momento de la aplicación.

Es importante que el todo sea controlado y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE MANEJO

No ingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con otros herbicidas de acción sistémica, azúcares, aceites, productos fungicidas o insecticidas.

FOTOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz dulce. En campos de maíz asociados a leguminosas se recomienda volver a sembrar maíz por la protección residual del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que se eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LOGO NEOAGRUM PANT 343 LOGO PRODUCTO PANT 293 CVC  
TEXTO NEGRO PANT 293 C  
B. TOXICOLÓGICA PANT 1375

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE





LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni fómies.
- No reemvasar ni depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel: lávese con abundante agua y jabón.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

OCOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC. 817-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vomito. No tome antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego realice el lavado o perforado y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuélvase el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos: fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio señalado por las autoridades locales para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o derrames del producto.

RAYO<sup>®</sup> 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atazina: 500 g/L  
Aditivos c.a.p. 1 L

Rio N° 153, 56, AG. SENASA  
Trujillo del Registro, Imprentado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC

neogrum  
Calle Cantuarias 270 Of. 101 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 817-6400 / Fax: 817-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:  
F. de Form.  
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por:  
Dr. Carlos E. Cordero, Ph.D.  
25 (Avenida) Road, Ventn  
China

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida de acción pre y post emergente para el control selectivo de muchas malezas anuales (bajo germinación como hoja joven) y perennes (bajo germinación como raíz) en cultivos de maíz, sorgo y trigo. RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas, para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas, pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO        | PLAGAS                                                  |                                                                          | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(g/L) | L.M.P.<br>(ppm) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                | Nombres Común                                           | Nombre Técnico                                                           |               |               |                 |
| Caña de azúcar | Luchera<br>Hierba mora<br>Pajón<br>Sabalillo<br>Verdejo | Euphorbia spp.<br>Sida spp.<br>Sida spp.<br>Sida spp.<br>Sida spp.       | 6.0 - 8.0     | -             | 0.5             |
| Maíz           | Verdejo<br>Yuyo<br>Mucuna<br>Mucuna                     | Amaranthus spp.<br>Amaranthus spp.<br>Amaranthus spp.<br>Amaranthus spp. | 1.5 - 3.0     | 30            | 0.25            |
| Sorgo          | Hierba de galinazo<br>Paja de gallina<br>Amor seco      | Chenopodium spp.<br>Chenopodium spp.<br>Bassia pilosa                    | 1.5 - 3.0     | 30            | 0.25            |

L.M.P.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las malezas en suelos pesados con alto contenido de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea controlado y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua en las aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con fungicidas de uso controlado con cada localización, acide, azules y productos herbicidas sistémicos. Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz, asociado a leguminosas (soja, alfalfa, etc.) y maíz dulce. En campo de maíz, evitar la cosecha no controlada de malezas para evitar la contaminación de los productos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que se aplican para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LOGO NEOAGRUM: PANT 343  
B. TOXICOLOGICA: PANT 263 C  
TEXTO: NEGRO  
LOGO PRODUCTO: PANT 263 CVC

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE