

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y luego enterrados, teniendo cuidado de no contaminar acequias o depósitos de agua potable.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

RAYO[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazine.....500 g/L
Aditivos hasta completar 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA
Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:

neoagrum

Av. Grau N° 715 Barranco
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD
Chenjiagang Chemical Park, Xiangshui County, Yancheng,
Jiangsu Province
CHINA

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

Contenido neto: 1 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.

RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera Hierba mora Pega pega o rabo de zorro	<i>Euphorbia</i> spp. <i>Solanum nigrum</i> <i>Setaria verticillata</i>	6.0 - 8.0	-	0.5
Maíz	Verdolaga Yuyo Chamico Matagusano	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus</i> spp. <i>Datura stramonium</i> <i>Flaveria bidentis</i>	1.5 - 3.0	30	0.25
Sorgo	Hierba de gallinazo Pata de gallina Amor seco	<i>Chenopodium</i> spp. <i>Eleusine indica</i> <i>Bidens pilosa</i>	1.5 - 3.0	30	0.25

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado.

RAYO 500FW es fácil de preparar, basta verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y siempre agitando a efecto de mantener la buena suspensión.

APLICACIÓN: **RAYO 500FW** se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de **RAYO 500FW** en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



COLORES: (CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES)		
NEGRO Texto	PANT. 293 CVC Banda Toxicológica	PANT. 293 CVC Nombre Comercial

COLORES LOGO NEOAGRUM		
PANT. 343 Verde Oscuro	PANT. 377 Verde Claro	PANT. 1375 Sol

VERSIÓN 04-SS
ÚLTIMA REVISIÓN: 01-06-11