

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400
- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



RAYO®

500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Atrazine..... 500 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. N° 153 - 96 - AG - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L Formulado por:
N° de Lote: HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
F. de Form.: 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
F. de Venc.: Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RAYO 500FW es un herbicida a base de atrazina que se emplea para el control selectivo de muchas malezas anuales tanto gramíneas como hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.

RAYO 500FW es absorbido tanto por las raíces como por las hojas de las malezas para luego inhibir la fotosíntesis. No inhibe la germinación de las malezas pero estas mueren una vez germinadas.

Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Lechera	<i>Euphorbia</i> spp.	6.0 - 8.0	-	0.5
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>			
Maíz	Pega pega o rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>	1.5 - 3.0	30	0.25
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
Sorgo	Yuyo	<i>Amaranthus</i> spp.	1.5 - 3.0	30	0.25
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Matagusanó	<i>Flaveria bidentis</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium</i> spp.			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: RAYO 500FW se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (no más de 2-3 hojas verdaderas) independientemente del estado del cultivo. Aplicar las mayores dosis en suelos pesados con altos contenidos de materia orgánica y las bajas a suelos ligeros como los arenosos. Es importante que se prepare bien el terreno así como la humedad del suelo al momento de la aplicación.

Es importante que el caldo sea correcto y uniformemente distribuido en campo independientemente de los volúmenes de agua empleados.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Evitar el uso de RAYO 500FW en cultivos de maíz asociados a leguminosas, maíz choclo y maíz chala. En campos de maíz perdidos a causas no controladas se recomienda volver a sembrar maíz por la prolongada residualidad del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

