

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Dañino si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- Puede causar sensibilización por contacto con la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico. Avermectinas
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Altamente tóxico para peces, organismos acuáticos y abejas.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



DYNAMEC® 1.8 CE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA / ACARICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICION

Abamectina 18 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Número de Registro:

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
René Descartes 170, Urb Sta. Raquel, II etapa, Ate Vitarte - Lima
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima- Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:
Syngenta Crop Protection
Monthey S.A.
Suiza

Fecha Form.:

Lote No.:

Contenido Neto: 1 Litro

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de productos que contienen el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Dynamec® 1.8% EC**, es un insecticida de amplio espectro, actúa principalmente por ingestión pero tiene alguna acción por contacto.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **Dynamec® 1.8% EC** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.
- **Dynamec® 1.8% EC** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/ha	mL/200 L		
Algodón	Arañita roja Gusano de hoja	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Alabama argillacea</i>	300 - 600		21	0,01
Apio	Arañita roja Mosca Minadora	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Liriomyza huidobrensis</i>	500 - 600		10	0,01
Cítricos	Acaro del tostado Acaro hialino	<i>Phyllocopturaoleivora</i> <i>Polyphagotarsonemuslatus</i>	560 - 1500		7	0,01
	Minador de brotes	<i>Phyllocnistiscitrella</i>	400 - 1000			
Flores y plantas ornamentales	Arañita roja Mosca Minadora	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Liriomyza</i> spp.	560 - 1500		NA	NA
Fresa	Arañita roja Acaro	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Phytonemus pallidus</i>	500 - 1000		7	0,01
Melón	Arañita roja Mosca Minadora	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Liriomyza</i> spp.	500 - 600		7	0,01
Papa	Acaro hialino Mosca Minadora	<i>Polyphagotarsonemuslatus</i> <i>Liriomyza</i> spp.	500 - 600		14	0,01
Palto	Acaro marrón	<i>Oligonychus punicea</i>		100	14	0,02
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemuslatus</i>		100	7	0,02
Tomate	Arañita roja Mosca Minadora Polilla	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Tuta absoluta</i>	500 - 600		3	0,02

P.C.: Periodo de Carenia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millon (ppm) NA: No Aplica

•FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Para obtener un control óptimo y económico **Dynamec® 1.8% EC** debe ser aplicado tan pronto se observen los primeros daños en el cultivo.
- El intervalo de aplicación, puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la reinfección o presión de la plaga.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no hacer mas de dos aplicaciones seguidas con **Dynamec® 1.8% EC** rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

•COMPATIBILIDAD

- En principio **Dynamec® 1.8% EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.
- En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

•FITOTOXICIDAD

- **Dynamec® 1.8% EC** a la dosis y usos recomendados no muestran fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. Para el caso de flores y plantas ornamentales, debido al gran numero de variedades que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que la características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con la condiciones e instrucciones dadas.

