LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos y/o animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- No reuse el envase, destrúyalo.
- No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

PRIMEROS AUXILIOS.- Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

NOTA AL MEDICO.- Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

DL_{50} Oral aguda : > 24,762.68 mg/kg
DL_{50} Dermal aguda : > 4,952.54 mg/kg

NO EXPLOSIVO • NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO

Driver®

(Giberelinas + Citoquininas)

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Giberelinas	21.04	g/l
Citoquininas	20.61	g/l
Extracto de algas	958.35	g/l

REGULADOR BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 096-SENASA.

Cont. Neto: 125 ml.
Expiración:
N° de Lote:

Formulado por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av Benavides 1579. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.

Distribuido por:
SUNNY VALLEY SAC
Calle Doña Amalia Surco
Lima Perú
Telf.: 358-3644

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse, por cualquier causa a consecuencia del usa, ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

INDICATIVOS DE USO

Driver es un regulador de crecimiento de plantas a base de Citoquininas y Giberelinas, las cuales tienen por efecto el desarrollo uniforme de raices y frutos. Además permite la elongación celular obteniendose así tallos bien conformados. **AGITAR ANTES DE USAR.**

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Diver por ser un liquido concentrado es necesario diluir en agua como vehiculo de aspersión para ser aplicado al follaje y frutos de las plantas mediente el uso de pulverizadas.

CULTIVO	Dosis en 200 Lts agua	Momento de aplicación (antes de cosecha)
Ajo	150 ml	30 días
Papa	125 ml	20 - 25 días
Melón	125 ml	15- 20 días
Sandia	200 ml	20 - 25 días
Haba	125 ml	25 días

CULTIVO	Dosis en 200 Lts agua	Momento de aplicación (antes de cosecha)
Cebolla : roja	125 ml	20 - 25 días
Amarilla	125 ml	25 - 30 días
Zapallo	125 ml	20 - 25 días
Alcachofa	125 ml	20 - 25 días
Paprika	125 ml	20 - 25 días

MANTENER ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES

LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCION

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO