PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Las feromonas de insectos no presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, sin embargo se recomiendan algunas medidas de acuerdo a la legislación local y vigente.
- Durante el manipuleo y ubicación de los dispersores se recomienda evitar el contacto con la piel, boca y ojos. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE LA INSTALACIÓN de los dispersores en campo.
- Evite el contacto directo con el dispersor o la ingestión accidental.
- Almacenar y transportar el producto en sus envases originales, herméticamente cerrados y refrigerados a temperaturas de 5 a 8°C bajo estas condiciones se puede almacenar por un año, si desea prolongar su almacenamiento refrigerarlo a -10°C ó 0°C
- No almacenar ni transportar conjuntamente con bebidas, productos alimenticios o medicinales.

PRIMEROS AUXILIOS

En general nunca se han reportado casos de intoxicación, en caso de presentarse síntomas de intoxicación por ingestión (náuseas, vómitos, diarrea), inhalación o contacto, el paciente debe mantenerse en reposo en un ambiente fresco, ventilado, cambiársele de ropa, lavar las partes contaminadas y acudir de inmediato al médico. Si es necesario, inducir al vómito. No es corrosivo a los ojos y piel.

ANTÍDOTO

No se ha determinado un antídoto específico, se debe dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA 436-4444. ALÓ ESSALUD 444-8444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Después de acabado el efecto del dispersor depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No eliminar los restos del dispersor en fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.

PHEROGEN PEGOS

SEMIOQUIMICO

FEROMONA AGRICOLA

Emisor de Vapores - VP

Composición:

Feromona *Pectinophora gossypiella* ..... 2.9 g/Kg
caucho natural ..... 996.9 g/Kg
Antioxidantes/Estabilizadores UV .....0.2 g/Kg

REG. No.: PBUA Nº 107-SENASA

TITULAR, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FITOCORP SAC
Jr. Las Poncianas N° 147 Interior 2 B
Urb. La Molina Vieja.
La Molina – Lima
Teléfono: 01 -652-2183

FITOCORP

FORMULADO POR:
PHEROBANK. Plant Research International B.V.
Dept. Address: P.O. Box 16, NL 6700 AA Wageningen. The Netherlands.

Contenido Neto:
Fecha de Producción:
Fecha de Expiración

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PHEROGEN PEGOS es un feromona sexual altamente específica para atraer machos de *Pectinophora gossypiella* con la finalidad de orientarlos hacia trampas o accesorios para destruirlos. También se utilizan con la finalidad de atraer una gran cantidad de polillas adultas y disminuir las probabilidades de apareamiento y en consecuencia se disminuye paulatinamente las poblaciones de plaga, mediante la reducción de la capacidad de postura y por ende de larvas que son las causantes de los daños de cultivos.
Viene en un dispersor de caucho natural que solo se colocan en dispositivos de cartón o suspendidos en bandejas.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
El dispersor de **PHEROGEN PEGOS** se ubica dentro de trampas colocándolos en diferentes puntos equidistantes en los campos de cultivo, para aprovechar la máxima capacidad de atracción de la feromona. Dependiendo del objetivo, el número de trampas con el dispersor es variable tal como se indica en cuadro de dosis.
Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es sumamente específico y no causa ningún efecto colateral en el manejo de plagas.
Es un producto totalmente compatible con sistemas de manejo integrado de plagas

"CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	Dosis (trampas con difusor/Ha)		LMR (ppm)	U.A.C (Dias)
	Monitoreo	Trampeo Masivo		
Algodón	1 - 2	20 - 30	0	0

LMR: Límite máximo de residuos (ppm) en parte por millón.
PC: Periodo de Carencia (Dias)
N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Usar los dispersores en la etapa fenológica donde se presenta la plaga y realizar el cambio de feromona en periodos de 30-45 dias hasta que la plaga objetivo ya no sea problema.

PERIODO DE REINGRESO
Se puede reingresar al área tratada de inmediato.

COMPATIBILIDAD
PHEROGEN PEGOS es compatible con todos los plaguicidas.

FITOTOXICIDAD
PHEROGEN PEGOS no es fitotóxico en los cultivos a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

PRECAUCION