28.0 cm

15.0 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

Nimbiol 0.1% CE no es tóxico vía oral y dermal, sin embargo siendo una sustancia de origen orgánica se recomienda en caso de ingestión inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
Antídoto, Nota al médico:
- Teléfonos de Emergencias.

CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositar en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Nimbiol®
0.1% CE
Extracto Vegetal

INSECTICIDA - FUNGICIDA - AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Ingrediente activo:
Aceite de Neem.....99.90 %
Azadirachtina.....0.10 %

Reg. PBUA Nº 113 SENASA

Titular de Registro, Importado Y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II tapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Formulado por:
FORTUNE BIOTECH LTD.
6-6-125 Annam gardens, Kavdiguda
Secunderabad - 500 380, A.P. India
Tel. 2753 4867, 2753 1888

Contenido Neto: **1 L**
Fecha de Formulación
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Nimbiol 0.1% CE es un insecticida y fungicida biológico extraído de las semillas del árbol tropical del Neem *Azaridachta indica*; está compuesto por una mezcla de más de 100 terpenoides, el más activo es la azaridactina.

Nimbiol 0.1 % CE como insecticida actúa por contacto, es letal para huevos y ninfas de *Bemisia tabaci*, actúa como un inhibidor de la alimentación y tiene acción repelente.
Como fungicida actúa de manera preventiva y curativa a inicios de la infestación.
En almacén, conserve a temperaturas mayores a 15°C, evite mantener stocks en lugares fríos.
Sistemas de preparación y aplicación:
Para una adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/cil (200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Café	Roya del café	*Hemileia vastatrix*	0.5 - 1	NA	NA
Mandarina	Minador de la hoja	*Phyllocnistis citrella*	1	NA	NA
Tomate	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	*1.5	NA	NA
Vid	Oidium	*Uncinula peruviana*	0.5 - 1	NA	NA

* Volumen de gasto de agua: 400 L/ha, L.M.R: Límite Máximo de Residuos, (partes por millón)
P.C.: Periodo de Carencia. NA: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia será de acuerdo a las recomendaciones del asesor técnico. No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

PERIODO DE REINGRESO No ingresar a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD NIMBIOL 0.1 % CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda usar con azufre ni cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos.

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN