

# DK-ZEB 80 PM

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:  
Mancozeb..... 800 g/kg
- Aditivos ..... 200 g/kg

**Reg. PQUA N° 011 -SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar  
Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
**ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.**  
Sofia 1000, Solunska Str. 58 B, FL. 1  
Apt. 1. Bulgaria.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 Kilo**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO POR PERSONAS QUE MANTENGAN TRATAMIENTO PARA EPILEPSIA, ESPECIALMENTE CON FENOBARBITAL”
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Causa irritación moderada a los ojos”
- “Evite contacto con la piel y la ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

## PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**  
**CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó**  
**ESSALUD Telf.: 423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

## MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- “Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”
- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre”

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Ha	Kg/200 L		
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.7	5	5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	-	0.75	ND	0.1
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	2.5 - 3.0	-	ND	0.1
Papa	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.2	0.5 - 0.6	14	0.1
Holantao	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.6	ND	ND

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia ND = No determinado

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DK ZEB 80 PM**, es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque de *Botrytis cinerea* en el cultivo de tomate, *Cercospora asparagi* en el cultivo de espárrago.

Actúa por contacto, inhibiendo los grupos sulfhídricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

**DK ZEB 80 PM**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones / campaña / año, en periodos de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

## COMPATIBILIDAD

**DK ZEB 80 PM**, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

