

# FARMATHE®

## 50 PM

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Mojable (WP)

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Benomyl ..... 500 g/Kg  
Ingredientes Inertes ..... 500 g/Kg

Reg. PQUA N° 027-SENASA  
R.U.C.: N° 20100180210

Importado y Distribuido por:


**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO** S/A 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS



Titular del registro:

**PINERAL ANDINA S.A.**

Av. Flora Tristán 463 Of. 201. Urb. Santa Patricia

II Etapa La Molina. Lima- Perú

Teléfono 348-1018 Telefax 349-9609

Fabricado y envasado por:

**Point Agro-China Limited.**

Room 1505-1506, Diamond Business Centre,

Nanxing Street, Shangcheng District,

Hangzhou 310008, China.

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**Ligeramente peligroso**  
**CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante a los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto por la piel y por inhalación.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:**

- Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- **No utilice este envase para conservar alimentos o agua.**
- **No disponer con residuos municipales.**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

**Teléfono de Emergencia toxicológica:  
CICOTOX 0 - 800 - 1- 3040**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques, fuentes de agua con desechos, restos de la aplicación, remanentes del producto y envases vacíos.
- Peligroso para abejas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Por mochila 15 l (gr)	Por cilindro 200 l (gr)		
<b>Apio</b>	Viruela del apio	<i>Septoria apii</i>	15	200	7	3
<b>Cebolla</b>	Podredumbre blanda	<i>Sclerotium cepivorum</i>	15	200	7	2
<b>Fresa</b>	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	15	200	0	5
<b>Frijol</b>	Antracnosis	<i>Sclerotinia sp</i>	37.5	500	14	2
<b>Manzano</b>	Sarna del manzano	<i>Venturia inaequalis</i>	15	200	30	7
<b>Melocotón</b>	Oidio	<i>Oidium sp</i>	15	250	14	15
<b>Melón</b>	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	15	200	5	1
<b>Tomate</b>	Viruela del tomate	<i>Septoria lycopersici</i>	15	200	5	5
<b>Vid</b>	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	15	200	7	10
<b>Rosas</b>	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	15	200	-	-

**DESINFECCIÓN DE SEMILLAS:**

<b>Papa</b>	Costa negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	100 g/100L/TM	14	3
-------------	-------------	---------------------------	---------------	----	---

**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**FARMATHE 50 PM** es un fungicida sistémico que al ser aplicado sobre el follaje es traslocado por la savia hacia toda la planta, al ser aplicado a las raíces estas lo absorbe y lo traslocan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor. Para semillas sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**FARMATHE 50 PM** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetir la aplicación entre 7 a 14 días. El numero máximo de aplicaciones de **FARMATHE 50 PM** es de 3 aplicaciones por campaña agrícola.

Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad.

No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**FARMATHE 50 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

**FARMATHE 50 PM** no es fitotóxico a los cultivos y dosis indicados en la etiqueta.

**Responsabilidad civil:**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

