

# Enlace®

50 PM


**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Mojable (WP)

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Benomyl ..... 500 g/Kg  
Ingredientes Inertes..... 500 g/Kg

**Reg. PQUA N° 027 - SENASA**



Titular del registro:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6, Lote 15. Urb. Santa Patricia  
II Etapa La Molina. Lima- Perú  
Teléfono 348-1018 / 349-9609

Fabricado y envasado por:  
**Point International Ltd.**  
42 St, Margarets Grove, Twickenham TW1 1JG  
United Kingdom.  
Tel. (44-20) 8892 3862

**Softagro®**  
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Importado y Distribuido por:  
**SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.**  
Av. Guillermo Dansey 2176  
Lima Cercado - Perú  
Telf: (01) 3368645/ (01) 3368299

**Contenido Neto: 1 Kg**

N° de Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante a los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto por la piel y por inhalación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

**Teléfono de Emergencia toxicológica:**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques, fuentes de agua con desechos, restos de la aplicación, remanentes del producto y envases vacíos.
- Peligroso para abejas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS Por cilindro 200 l (gr)	Periodo de carenia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
<b>Apio</b>	Viruela del apio	<i>Septoria apicola</i>	200	7	3
<b>Cebolla</b>	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	200	7	2
<b>Fresa</b>	Moho gris	<i>Botrytis cinarea</i>	200	0	5
<b>Frijol</b>	Podredumbre blanca	<i>Sclerotinia sp</i>	500	14	2
<b>Manzano</b>	Sarna del manzano	<i>Venturia inaequalis</i>	200	30	7
<b>Melocotón</b>	Oidio	<i>Oidium sp.</i>	250	14	15
<b>Melón</b>	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	5	1
<b>Tomate</b>	Viruela del tomate	<i>Septoria lycopersici</i>	200	5	5
<b>Vid</b>	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	200	7	10
<b>Rosas</b>	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	200	-	-

**DESINFESTACIÓN DE SEMILLAS:**

<b>Papa</b>	Costra negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	100 g/100L/TM	14	3
-------------	--------------	---------------------------	---------------	----	---

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ENLACE 50 PM** es un fungicida sistémico que al ser aplicado sobre el follaje es traslocado por la savia hacia toda la planta, al ser aplicado a las raíces estas lo absorben y lo traslocan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.  
Para semillas sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**ENLACE 50 PM** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetir la aplicación entre 7 a 14 días. El número máximo de aplicaciones de **ENLACE 50 PM** es de 3 aplicaciones por campaña agrícola.

Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad.

No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**ENLACE 50 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

**ENLACE 50 PM** no es fitotóxico a los cultivos y dosis indicados en la etiqueta.

**Responsabilidad civil:**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

