LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante a los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto por la piel y por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800-13040 / CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 117, 411-8000
POINT ANDINA S.A.: (01) 3481018, (01) 3499609

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y deposítela en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques, fuentes de agua con desechos, restos de la aplicación, remanentes del producto y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ENLACE 50 PM es un fungicida sistémico que al ser aplicado sobre el follaje es traslocado por la savia hacia toda la planta, al ser aplicado a las raíces estas lo absorben y lo traslocan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.
Para semillas sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:
ENLACE 50 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetir la aplicación entre 7 a 14 días. El número máximo de aplicaciones de **ENLACE 50 PM** es de 3 aplicaciones por campaña agrícola.

Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ENLACE 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
ENLACE 50 PM no es fitotóxico a los cultivos y dosis indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Apio	Viruela del apio	*Septoria apiicola*	200	7	3
Cebolla	Podredumbre blanca	*Sclerotium cepivorum*	200	7	2
Fresa	Moho gris	*Botrytis cinerea*	200	0	5
Frijol	Podredumbre blanca	*Sclerotinia sp.*	500	14	2
Manzano	Sarna del manzano	*Venturia inaequalis*	200	30	7
Melocoton	Oidio	*Oidium sp.*	250	14	15
Melon	Oidio	*Erysiphe cichoracearum*	200	5	1
Tomate	Viruela del tomate	*Septoria lycopersici*	200	5	5
Vid	Oidio	*Erysiphe necator*	200	7	10
Rosas	Oidio	*Sphaerotheca pannosa*	200	-	-

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS:

Papa	Costra negra	*Rhizoctonia solani*	100 g/100 L/ TM	14	3

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).
PC: Período de Carencia en días. * El producto solo se debe aplicar en la etapa de presiembra o en la instalación del cultivo de cebolla.