

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: ARIS INDUSTRIAL S. A. (01) 336 5428
CICOTOX (01) 328 7398 y ALO ESSALUD (01) 472 2300 (Las 24 Horas)

RECOMENDACIONES PARA EL MÉDICO.

El médico debe instituir un tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.

- No disponer con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
- Muy peligroso para las abejas, nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para el ganado.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



BULLTRIM

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE- EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250 g/l
Aditivos..... c.s.p.1 L

Registro PQUA N° 062 – SENASA

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.



FABRICADO POR: SINOCHEN NINGBO CHEMICALS CO., LTD

Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Oficina Central: 21 JIANGXIA STR., 315000 NINGBO CHINA

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A

Av. Industrial 491, Lima. Perú. - Telf.: 336 5428

No de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 1 L



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

GENERALIDADES

BULLTRIM es un insecticida piretroide sintético que actúa por contacto e ingestión. Tiene rápida acción de volteo y buena residualidad. Tiene un amplio espectro de acción, controlando numerosas plagas que se alimentan del follaje.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aplicar **BULLTRIM** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una premezcla de aplicación y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.
- Solo debe realizarse "aplicaciones terrestres" a fin de minimizar la dispersión del producto en la zona.
- El agua con que se haga la mezcla de
- aplicación debe ser limpia, libre de arcillas y otras partículas en suspensión ya que estas "atrapan" el ingrediente activo y lo inutilizan. No usar aguas duras o alcalinas, en todo caso usar un acidificante para bajar a un pH de 5 o 6, que es el ideal para este producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

Cultivos	Malezas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	ml/cil 200L	ml/Ha		
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	100 - 200	-	21	N/d
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	-	300 - 400	15	0.1
	<i>Copitarsia corruda</i>	Copitarsia		700- 800	3	
Alcachofa	<i>Heliothis virescens</i>	Heliothis	200- 250	-	3	0.1

PC: Periodo de carencia
LMR : Limite máximo de residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Para todos los cultivos debe aplicarse cuando aparece la plaga o cuando se ha llegado a un nivel crítico.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de la marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD

BULLTRIM no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

