

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Solo para aplicación foliar.

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:  
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó  
ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- “Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto o desechos de envases vacíos”.
- “No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los restos o sobrantes y envases vacíos”.
- “Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración”.
- “No aplicar directamente al suelo. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

DK-PRID® 35% SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Imidacloprid ..... | 350 g/l  |
| Aditivos .....     | 650 g/l  |
| TOTAL              | 1000 g/l |

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Reg. PQUA N° 071-SENASA

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.  
Av. 28 de Julio N° 150 - Piso 7 - Miraflores  
Telf.: 219-3901 Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR: SUNDAT (S) PTE LTD  
26 Gul Crescent Singapore 629532

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.  
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-PRID 35% SC es un insecticida altamente sistémico elaborado a base de Imidacloprid, ingrediente activo que posee acción de contacto e ingestión. Es utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas, las aplicaciones van directamente vía foliar o sistema de riego tecnificado.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-PRID 35% SC se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

| CULTIVO   | PLAGA                                 |                                   | DOSIS     |              | PC días | LMR ppm |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|
|           | NOMBRE COMÚN                          | NOMBRE CIENTÍFICO                 | ml/200 L  | L/ha         |         |         |
| Mandarina | Minador de los cítricos               | Phyllocnistis citrella            | 75 - 100  | -            | 30      | 1       |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes               | Prodiplosis longifila             | 150 - 200 | -            | 3       | 0.05    |
| Cebolla   | Trips                                 | Thrips tabaci                     | 150 - 200 | -            | 21      | 0.05    |
| Holantao  | Mosquilla de los brotes               | Prodiplosis longifila             | 150 - 200 | -            | ND      | 4       |
| Tomate    | Mosquilla de los brotes               | Prodiplosis longifila             | 150 - 200 | -            | 3       | 0.1     |
| Algodón   | Pulgón                                | Aphis gossypii                    | 75 - 100  | -            | 14      | 4       |
| Páprika   | Mosquilla de los brotes               | Prodiplosis longifila             | 150 - 200 | -            | 7       | 0.5     |
| Palto     | Queresa parda                         | Coccus hesperidum                 | 150 - 200 | -            | 14      | 0.05    |
| Papa      | Mosquilla de los brotes               | Prodiplosis longifila             | 150 - 200 | -            | 21      | 0.5     |
| Vid*      | Filoxera de la vid                    | Viteus vitifoliae                 | -         | 1.5 - 2.0    | 30      | 1       |
| Arroz     | Cigarrita del virus de la hoja blanca | Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus | -         | 0.1 - 0.15** | 30      | 1.5     |
| Manzano   | Pulgón verde del manzano              | Aphis pomi                        | 100 - 150 | -            | 14      | 0.5     |
| Vid       | Mosquilla de los brotes               | Prodiplosis longifila             | 150 - 200 | -            | 30      | 1       |

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia ND: No determinado

\* Dosis recomendada para aplicaciones vía sistema de riego tecnificado

\*\*Volumen de agua recomendado 200 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Realizar un máximo dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: DK-PRID 35% SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

