

15 cm

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “ESTE PRODUCTO DITOCARBAMATO NO PUEDE SER USADO POR PERSONAS QUE MANTENGAN TRATAMIENTO PARA EPILEPSIA, ESPECIALMENTE CON FENOBARBITAL. MANTENER ALEJADAS DEL ÁREA DE APLICACIÓN A PERSONAS EMBARAZADAS”.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto directo y prolongado.
- Irritante a la piel, si el contacto fuese con la piel retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón, incluido el cabello.
- Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto directo y prolongado con la piel.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dithiocarbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- “Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”.
- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre”.
- “No aplicar en áreas con napa fréatica superficiales”.
- “En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

29 CM.

DK-ZEB 40 LIQ®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Mancozeb 400 g/L
- Aditivos C.s.p 1L

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, Piso 9
Magdalena del Mar, Lima-Perú
Telf.: 501-1000



FORMULADO POR: AGRIPAC S.A. P E R U
Córdova 623 y Padre Solano, Guayaquil-Ecuador

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial.
Independencia. Teléfono: 219-3901

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-ZEB 40 LIQ es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque del Hielo o Mancha en el cultivo de papa, y Cercospora en el cultivo de Espárrago. Actúa por contacto inhibiendo los grupos sulfhídricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-ZEB 40 LIQ se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con equipo de aspersión manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200 L	DOSIS L/ha	LMR ppm	PC días
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Papa	Hielo o Mancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.2 - 1.5	2.4 - 3	0.1	21
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	0.66 - 1	2 - 3	0.1	28

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones / campaña / año, en periodos de 7 - 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK-ZEB 40 LIQ, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina .

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

