

Sumisclex

50% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Poivo Mojable (WP)

Composición
Procymidone, 500 g/kg
Aditivos csp, 1 kilo

Reg. N° PQUA 85-SENASA

Titular del Registro:
SMTM Perú S.A.C
Av. República de Panamá 3531,
Of. 1203 - Lima 27
T: 511-421-4811

Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Telf: 2113800



Formulado por:
Sumitomo Chemical Co. Ltda
27-1, Shinkawa 2-come, Chou-Ku
Tokyo 104-8260, Japón

Contenido

Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

● Marca Registrada de Sumitomo Chemical Co. Ltda

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Amacurar el producto herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños.

-Durante la preparación y la aplicación usar ropa, mascarar y guantes protectores.

-Evitar el contacto con la piel e inhalar el momento de la aplicación.

-Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.

-No comer ni fumar durante la aplicación.

-Lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa después de la aplicación.

-No volver el resto de aspersión sobre fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias).

-Los sobrantes del producto deben guardarse en el envase original bien tapados.

-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo químico: Dicarboximidas.

-Si se ha contaminado la piel, acudir de inmediato al médico, entretanto cambiar de ropa contaminada al paciente y lavar con abundante agua y jabón.

-En caso de intoxicación por ingestión dar de beber 1-2 vasos de agua e inducir el vómito mecánicamente.

-Inhalando un dedo en la garganta.

-En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua durante por lo menos 15 minutos y solicitar atención médica inmediata.

-No se ha determinado un antídoto específico. El tratamiento es básicamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTEX: 0800-1-3040 CISPROM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

-No mezclar con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques ni fuentes de agua con desechos y envases vacíos de aplicación o sobrantes del producto.

-No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

-No usar el producto en suelos con napa freática superficial.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL	DOSIS	OBSERVACIONES	PC* (dias)	LMR** (ppm)
Vid	Podredumbre o mocho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.: Calda de capucha floral 2da aplic.: Antes del cierre del racimo 3ra aplic.: Al inicio de la maduración o errera	28	5
Fresa	Podredumbre o mocho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.: 50% de floración 2da aplic.: Fin de floración 3ra aplic.: Frutos verdes	21	2
Naranja	Podredumbre o mocho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.: 50% de floración 2da aplic.: Al término de la floración	n/d	3
Ajo	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil 2.5 - 5 g/kg semilla (dientes)	Aplicar dirigiendo la aspersión al cuello de la planta. Imprimir las plantas dirigiendo la aspersión al cuello de la planta. Mezclar con AgriDex 0.05% o 100 ml/cil.	1	2
Tomate	Podredumbre o mocho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Proteger la flor y frutos pequeños	21	3
Frutales: Habas, Frijol, Zapallo, Sándia	Mancha de la hoja	Alternaria sp.	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.: 50% floración 2da aplic.: Término de floración 3ra aplic.: y otras: Repetir cada 7 ó 14 días según necesidad.	n/d	n/d
Cacao	Mancha de la hoja	Monilia sp.	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar al inicio del ataque	n/d	n/d
Floras y ornamentales	Podredumbre o mocho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicación: Cuando se encuentre en estado de botón floral	n/d	n/d
Lechuga	Podredumbre o mocho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Pulverizar en los siguientes estados de planta: 1 - 3 hojas 2 - 6 hojas 3 - 12 hojas	7	2

* PC = Período de curación (días) ** LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm) n/d = No determinado

