

Sumisclex

50% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Procymidone 500 g/Kg

Aditivos csp 1 Kg

Reg. N° PQUA 85-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, TORRE III.

Urbanización Club Golf Los Incas

Santiago de Surco. Lima, Perú

FORMULADO POR:

 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku,

Tokyo, 103-6020, Japan.

DISTRIBUIDO POR:



Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro. Lima-Perú

Telf: 2113800

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto puede ser mortal si se ingiere.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Dicarboximidas

• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

• En caso de intoxicación por ingestión dar de beber 1-2 vasos de agua e inducir el vómito mecánicamente introduciendo un dedo en la garganta.

• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No se ha determinado un antídoto específico. El tratamiento es básicamente sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
SAMU: 106 SMTM PERU S.A.C 01 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

• Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques ni fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

• No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.

• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

• No usar el producto en suelos con napa freática superficial.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sumisclax 50% PM es un fungicida preventivo del grupo dicarboximide, de amplio espectro de acción, para el control de *Botrytis*, *Alternaria*, *Monilia*, etc.

MODO DE EMPLEO:

• Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua, es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión,

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Seguir las indicaciones para cada cultivo según el cuadro de uso

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

Se puede aplicar en mezcla con los principales fungicidas, insecticidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico con los cultivos recomendados.

“La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (%) (g/cil)	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC* (Días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Vid	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar de preferencia en forma preventiva protegiendo principalmente el período de floración 1ra aplic.:Caída de capucha floral 2da aplic.:Antes del cierre del racimo 3ra.aplic.:Al inicio de la maduración o envere	5	28
Fresa	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.:50% de floración 2da aplic.:Fin de floración 3ra.aplic.:Frutos verdes	2	21
Naranja	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.:50% de floración 2da aplic.:Al término de la floración	3	n/d
Ajo Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar dirigiendo la aspersión al cuello de la planta. Impregnando en seco mediante cilindro rotatorio. Mojar bien las plantas dirigiendo la aspersión al cuello de la planta. Mezclar con Agridex 0.05% ó 100 ml/cil.	2	1
	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	2.5 - 5 g/kg semilla (dientes) 0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil			
Tomate Frejol Habas Apio Pepino Zapallo Sandía	Podredumbre o moho gris Mancha de la hoja	Botrytis cinerea Alternariasp.	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Proteger la flora y frutos pequeños 1ra aplic.:50% floración 2da aplic.:Término de floración 3ra aplic. y otras: Repetir cada 7 ó 14 días según necesidad.	3	21
Cacao Melocotonero	Monilia o podredumbre morena	Monilia sp	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar al inicio del ataque	n/d	n/d
Flores y ornamentales	Podredumbre o moho gris Podredumbre blanca Mancha de la hoja	Botrytis cinerea Sclerotinia sp. Alternaria sp	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicación: Cuando se encuentre en estado de botón floral	n/d	n/d
Lechuga	Podredumbre o moho gris Podredumbre blanca	Botrytis cinerea Sclerotinia sp	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Pulverizar en los siguientes estados de planta: 1 - 3 hojas 2 - 8 hojas 3 - 12 hojas	2	7

* PC = Período de carencia (días)

** LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

n/d= No determinado

