

SENECUR® WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

BENALAXYL.....	80.00 g/kg
MANCOZEB	650.00 g/kg
ADITIVOS	c.s.p. 1 Kg

Nº de Registro: PQUA Nº 111-SENASA

Titular del registro: ITAGRO S.A.

Importado y
Distribuido por:



Formulado por:



Contenido Neto:

1 Kilo

Lote Nº:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

SENECUR® WP
BENALAXYL + MANCOZEB

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla, aplicación, almacenamiento y manipulación del producto.
- Causa sensibilización a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación ligera al tracto respiratorio.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No exponer a mujeres embarazadas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico Benalaxil: Phenilamidas
- Grupo Químico Mancozeb: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación acudir al médico, mostrando la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.
- En caso de ingestión, efectuar lavado estomacal. Proseguir con un purgante alcalino.
- Tratar los síntomas y proporcionar una terapia necesaria. No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Telef: 3287398.
- ITAGRO Telef. 349-6805
- No dar de beber nada a un paciente inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- No reutilizar los envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces y demás organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el campo de cultivo.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por mochila 20 litros	Por cilindro 200 L.	Por Ha.		
PAPA	“rancha ó seca seca” ó “Hielo fungoso”	<i>Phytophthora infestans</i>	50 gramos	500 gr.	1-2 Kg.	28	0.02
CEBOLLA	“mildiu”	<i>Peronospora destructor</i>	50 gramos	500 gr.	1 Kg.	28	0.2
VID	“mildiu”	<i>Plasmopara viticola</i>	50 gramos	500 gr.	1 Kg.	28	0.02
QUINUA	“mildiu”	<i>Peronospora farinosa</i>	50 gramos	500 gr.	2 Kg.	n.d.	n.d.

n.d.: No determinado

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SENECUR WP es un fungicida de acción sistémica que previene y cura hongos Peronosporales. Actúa tanto en la parte interna como externa de la planta.

Preparación de la mezcla: a la mitad de la cantidad de agua agregar la dosis completa de **SENECUR WP**, agitar y completar el volumen de agua, luego volver a agitar.

Equipo de aplicación: **SENECUR WP**, se puede aplicar con pulverizadora manual o mecánica. Durante las aplicaciones se debe tener cuidado que haya una buena cobertura sin llegar al punto de goteo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se deben iniciar los tratamientos cuando las condiciones climatológicas sean favorables para el desarrollo del patógeno y repetir con un intervalo mínimo de 7 días dependiendo del grado de infección.

Se autoriza un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Efectuar

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

SENECUR WP, no es fitotóxico cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

