

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- "El producto es sensibilizante y causa irritación moderada a los ojos"
- "No comer, beber, ni fumar cuando se está manejando el producto".
- "Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado".
- "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes".
- "Después de usar el producto, lave la ropa empleada y bañese con abundante agua y jabón".
- "Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación".
- "Estándares de higiene tienen que ser observados en todo momento".
- "Evitar el contacto con la piel y los ojos durante su aplicación".
- "Mantener alejado a los niños y animales del lugar de aplicación"
- "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable".

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.**

" En caso de intoxicación o sobre exposición, aplicar los primeros auxilios y buscar ayuda medica tan pronto como sea posible".

**En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos con agua limpia por lo menos 10 minutos. Obtener asistencia médica.

**En caso de contacto con la piel:** Lavar la piel con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación llamar al médico. Mover al paciente hacia el aire fresco. Llamar al medico.

**En caso de inhalación:**

**En caso de emergencia toxicológica llamar a:**  
CICOTOX : 0800-1-13040  
ESSALUD : 472-2300

**AVISO PARA EL MÉDICO**

No se conoce un antídoto específico . Deberá tratarse de forma sintomática.

**DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS.**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos , estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En el caso de derrames, vierta arena o tierra, sobre el producto derramado y recoja en recipientes. Aísle y lleve a un lugar seguro.

# FUNGAFLOR 500 CE

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

- Ingrediente activo: Imazalil..... 500 g/L
- Aditivos ..... c.s.p. 1L

REGISTRO N°: PQUA N° 068-SENASA



**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO**

**INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.**  
Av. Tomas Marsano 2147, Lima 34 -Perú  
Telf.: 511-2719909 Fax: 511-2719909

**FORMULADOR:**

**JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse, Bélgica  
Telf.: 32-14-605751  
Fax. 32-14-605951

Número de lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

contenido neto 1 litro.

**NO EXPLOSIVO, NO CORROSIVO, NO INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FUNGAFLOR 500 es un fungicida para uso exclusivo en postcosecha dentro de plantas de procesamiento, una sola aplicación realizada en el encerado de frutos a la dosis indicada en el cuadro de abajo, es suficiente para dar protección contra diversos hongos patógenos causantes de pudriciones. Durante la manipulación y aplicación del encerado de frutos, debe mantenerse las reglas básicas de higiene y cuidado, estando el personal debidamente capacitado para tal fin.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

**CUADRO DE DOSIS**

CULTIVO	PATÓGENO		DOSIS		P.C Días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	ml FUNGAFLOR 500 CE / Litro de cera/ TM de fruta	ppm		
Mandarina	Moho verde	<i>Penicillium</i>	4 - 8	2000 - 4000	N.A.	5
Naranja		<i>digitatum</i>				
Limon			6 - 8	3000 - 4000		

P.C.: Periodo de Carencia.

N.A.: No Aplicable.

ppm: Partes Por Millón.

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos.

**PREPARACIÓN EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN**

Se aplica en la postcosecha durante la fase del encerado de la fruta. Se prepara adicionando la dosis indicada del FUNGAFLOR 500 CE en el recipiente con la cera a emplear, mezclar y agitar bien con un mezclador, nunca con la mano. Previamente la banda de procesamiento de frutos debe estar debidamente calibrado.

**N° DE APLICACIONES:** 1 sola aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos a excepción con los de reacción alcalina.

**FITOTÓXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendadas

**RESPONSABILIDAD CIVIL.**

"El titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE  
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

