

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es sensibilizante y causa irritación a los ojos.
- No comer, beber o fumar cuando está manejando el producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa empleada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Estándares de higiene tienen que ser observados durante su aplicación.
- Mantener alejado a los niños y animales del lugar de aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o sobre exposición, aplicar los primeros auxilios y buscar ayuda médica tan pronto sea posible.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua limpia por lo menos 10 minutos. Obtener asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: lavar la piel con abundante agua y jabón, si persiste la irritación llamar al médico.
- En caso de inhalación: Mover al paciente hacia el aire fresco. Llamar al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800 -1 -3040, ESSALUD EN LINEA: 411 - 8000
- ANEXO 4 - CUSPROQUIM: 0800-50-847.

aviso para el médico:

No se conoce un antídoto específico. Deberá tratarse de forma sintomática.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En el caso de derrames, vierta arena o tierra, sobre el producto derramado y recoja en recipientes. Aísle y lleve a un lugar seguro.

FUNGAFLOR

500 CE

Plaguicida Químico de uso agrícola
FUNGICIDA AGRICOLA
Concentrado Emulsionable (CE)

Composición: Imazail 500 g/L
Aditivos csp..... 1 L

Registro PQUA N° 068-SENASA

Formulado por:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Dirección: Turnhoutseweg 30 B-2340
Beerse, Bélgica.
Telf.: 32-14-605751, Fax: 32-14-605951.

Titular de registro:

AGRILAB PERÚ S.R.L.
Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105,
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227

Importador y distribuidor:

INTERANSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.
Av. Tomas Marsano 2147, Lima 34 - Perú
Telf.: 511-2719909 Fax: 511-2719909

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: **1 L** NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



NO INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNGAFLOR 500 CE, es un fungicida para uso exclusivo en post cosecha dentro de plantas de procesamiento, una sola aplicación realizada en el encrado de frutos a la dosis indicada en el cuadro de abajo, es suficiente para dar protección contra diversos hongos patógenos causantes de pudriciones. Durante la manipulación y aplicación del encrado de frutos, debe mantenerse las reglas básicas de higiene y cuidado, estando el personal debidamente capacitado para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

Cultivo	Control de Plaga		Dosis	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina					
Naranja					
Limón	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	4-6 6-8	2000-4000 3000-4000	N A 5

P.C.: Período de Carenia

N.A.: No aplicable.

ppm: Partes por Millón.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica en la postcosecha durante la fase del encrado de la fruta. Se prepara adicionando la dosis indicada del FUNGAFLOR 500 CE en el recipiente con la cera a emplear, mezclar y agitar bien con un mezclador, nunca con la mano.

Previamente la banda de procesamiento de frutos debe estar debidamente calibrado.

PERIODO DE REINGRESO: 1 sola aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.