

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es sensibilizante y causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber, ni fumar cuando se está manejando el producto.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, lave la ropa empleada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación.
- Estándares de higiene deben ser observados durante su aplicación.
- Mantener alejado a los niños y animales del lugar de aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **En caso de intoxicación o sobre exposición:** Aplicar los primeros auxilios y buscar ayuda médica tan pronto como sea posible.
- **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos con agua limpia por lo menos 10 minutos. Obtener asistencia médica.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar la piel con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación llamar al médico.
- **En caso de inhalación:** Mover al paciente hacia el aire fresco. Llamar al médico.

**Nota para el médico:**

No se conoce un antídoto específico. Deberá tratarse en forma sintomática.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU:106 - Teléf. del titular: L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC: (+51-01)382-4874

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En el caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# FUNGAFLOR® 500 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

**COMPOSICIÓN:**

- Imazalil ..... 500 g/L
- Aditivos ..... c. s. p. 1 L

Reg. PQUA N° 068-SENASA

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**



**INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.**

Av. Tomás Marsano 2147, Lima 34 - Perú  
Telf.: 511-2719909 Fax: 511-2719909

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**L & M Servicios Agrícolas Integrales SAC**  
Av. República de Panamá 3418 Of. 301 - Torre Barlovento  
San Isidro - LIMA  
Teléfono: (+51-01) 382-4874

**FORMULADOR:**

**JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**  
Turnhoutsweg 30  
B-2340 Beerse, Bélgica  
Tel: 32-14-605751, Fax: 32-14 605951  
info@janssenpmp.com

Lote N°.: .....

F. de Form.: .....

F. de Venc.: .....

Contenido Neto: 1L

**NO EXPLOSIVO, NO CORROSIVO, NO INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FUNGAFLOR 500 CE es un fungicida para uso exclusivo en postcosecha dentro de plantas de procesamiento, una sola aplicación realizada en el encerado de frutos a la dosis indicada en el cuadro de abajo, es suficiente para dar protección contra diversos hongos patógenos causantes de pudriciones. Durante la manipulación y aplicación del encerado de frutos, debe mantenerse las reglas básicas de higiene y cuidado, estando el personal debidamente capacitado para tal fin.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. Días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/Litro de cera/ TM fruta	ppm		
MANDARINA NARANJA	MOHO VERDE	Penicillium digitatum	4 - 6	2000 - 4000	N/A	5
LIMÓN			6 - 8	3000 - 4000		

P.C.: Período de Carencia.

N/A: No Aplicable.

ppm: Partes Por Millón.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se aplica en la postcosecha, durante la fase del encerado de la fruta. Se prepara adicionando la dosis indicada del FUNGAFLOR 500 CE en el recipiente con la cera a emplear, mezclar y agitar bien con un mezclador, nunca con la mano. Previamente la banda de procesamiento de frutos debe estar debidamente calibrada.

**N° de aplicaciones:** 1 aplicación

**PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PMP2201/L/PE/BC023979

