

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es sensibilizante y causa irritación a los ojos.
- No comer, beber o fumar cuando esta manejando el producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa empleada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Estándares de higiene tienen que ser observados durante su aplicación.
- Mantener alejado a los niños y animales del lugar de aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de intoxicación o sobreexposición:** Aplicar los primeros auxilios y buscar ayuda medica tan pronto sea posible.
- **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos con agua limpia por lo menos 10 minutos. Obtener asistencia medica.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar la piel con abundante agua y jabón. si persiste la irritación llamar al médico.
- **En caso de inhalación:** Mover al paciente hacia el aire fresco. Llamar al médico.

NOTA PARA EL MÉDICO:

No se conoce un antídoto específico, Deberá tratarse de forma sintomática.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106. Teléfono del titular: L&M Servicios Agrícolas Integrales S.A.C.: (+ 51-01) 382 - 4874

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En el caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

FUNGAFLOR[®] 500 CE

Plaguicida Químico de uso agrícola

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (CE)

Composición:

Imazalil500 g/L
Aditivos csp.....1 L

Registro PQUA N° 068-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC
Av. Javier Prado Este 488. Piso 7.
San Isidro - Lima - Perú
Telf: +(51-01) 382-4874

FORMULADOR:

Janssen Pharmaceutica N.V.
Dirección: Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Bélgica
Telf: 32-14-605751, Fax.: 32-14 605951
Info@janssenpmp.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Intersansa Comercial S.A.C
Dirección: Car. Car. Panamericana Sur Km. 37.2 Mza. G1
Lote. 3 Z.I. Asociación
Sumap Pacha. Lima - Lima - Lurin - Perú
Telf: +511 6285844, Fax.: 32-14 605951

Lote N°.
F. de Form.:
F. de Vencimiento:
Contenido neto: **1L**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNGAFLOR 500 CE, es un fungicida para uso exclusivo en post cosecha dentro de plantas de procesamiento, una sola aplicación realizada en el encerado de frutos a la dosis indicada en el cuadro de abajo, es suficiente para dar protección contra diversos hongos patógenos causantes de pudriciones. Durante la manipulación y aplicación del encerado de frutos, debe mantenerse las reglas básicas de higiene y cuidado, estando el personal debidamente capacitado para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Control de Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/Litro de cera/TM de fruta	ppm		
Mandarina Naranja	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	4-6	2000-4000	N.A.	5
Limón			6-8	3000-4000		

P.C: Periodo de Carencia

N.A: No Aplicable

ppm: Partes por Millón

LMR: Límite máximo de Residuos.

PREPARACIÓN EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN

Se aplica en la postcosecha durante la fase del encerado de la fruta. Se prepara adicionando la dosis indicada del FUNGAFLOR 500 CE en el recipiente con la cera a emplear, mezclar y agitar bien con un mezclador, nunca con la mano. Previamente la banda de procesamiento de frutos debe estar debidamente calibrado.

N° DE APLICACIONES: 1 aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

