



Sulfodin®
80% WG

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y PLICACION:

Preparación. Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) usa máscara, guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. No lavar la ropa usada. Terminada la labor, lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.

Precauciones. Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajes y fuentes de agua. Anacardol en sus envases lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones. No se debe anacardol ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, forrajes, medicinas y bebidas.

Almacenamiento. Aplicar con temperaturas mayores de 30°C.

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Reacciones alérgicas en ciertas personas.
EFECTOS SECUNDARIOS:
 Se debe ingerir un lavado estomacal con carbón medicinal en agua y administrar laxantes salinos (Sulfato de sodio 20-30 g). En caso de deshidratación, administrar líquidos y sal. Si se presentan dificultades respiratorias administrar oxígeno o dar respiración artificial.
INDICACIONES PARA EL MÉDICO:

trátese sintomáticamente.

NOTA:
No existe antídoto específico. Seguir las indicaciones del médico.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
CICOTOX 0800-1-3040 CIPROQUIM 0800-50847

TOXICACION: CISPROMQUIM: 0800-50847

1-800-762-6646 800-762-6646

® = Marca Registrada del grupo Bayer

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

Composición:
Azufre, 800 g/kg
Aditivos, csp. 1 kg

Reg. PQUA N° 043-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10, San Isidro.

Formulado por:
Quimetal Industrial S.A.
Calle Estier 748, San Miguel
de los Baños, Santiago
de Chile

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMMABLE

**Contenido
Neto: 1 kg.**

ote No

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Sulfodin[®]
80% WG

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. No reintasar o depositar el contenido en otros envases. No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

DELABIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
No permitir el ingreso de animales a las zonas tratadas.
No aplicar en época de floración del cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo



Sulfodin® 80% WG

GENERALIDADES:
Sulfodin 80% WG es un acaricida inorgánico recomendado para el control de araña en mandarina y palto además de oídio en pimiento y vid.

INDICACIONES DE USO:
Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar una pre-mezcla diluyendo el producto en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC ^a días	LM ^b ppm
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/ha	%**	Kg/cil		
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	—	0.25	0.5	7	50
Pimiento	Odium	<i>Leveillula taurica</i>	1.5-2	0.375-0.5	0.75-1	7	50
Vid	Odium	<i>Erysiphe necator</i>	—	0.5	—	5	NR
Pallo	Araña marrón	<i>Oligonychus punicea</i>	—	—	1	7	NR

PC=Periodo de carencia (en días) **LMP=Límite máximo de residuos (en ppm)
N.R: No requiere
** %a concentración válida sólo para aplicaciones con pulverizadora manual de mochila.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicaciones de acuerdo a poblaciones de plaga en el cultivo. Se recomienda realizar hasta 5 aplicaciones por campaña.

FITOTOXICIDAD:

tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados. Puede ser perjudicial si se aplica a temperaturas mayores de 30°C.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser empleado en mezcla con otros plaguicidas excepto con aceites de petróleo.

PERIODO DE REINGRESO:

2 horas.