




LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) use máscara, guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Terminada la labor, lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. Almacenarlo en sus envases lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, forrajeros, medicinas y bebidas. No aplicar con temperaturas mayores de 30°C.
Causa irritación moderada a los ojos.
El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Si se quiere realizar un lavado estomacal con carbón medicinal en agua y administrar lavantes salinos (Sulfato de sodio 20-30 g). En caso de deshidratación, administrar líquidos y sal. Si se presentan dificultades respiratorias administrar oxígeno o dar respiración artificial.
Trátese sintomáticamente.
No existe antídoto específico. Seguir las indicaciones del médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 CISPROQUIM: 0800-50847
Bayer S.A.: 01-2113800



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:
Azufre, 800 g/kg
Aditivos, csp. 1 Kg
Reg. PQUA N° 043-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 902, Urb. Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Formulado por:
Quimetal Industrial S.A.
Los Yacimientos 1301, Maipo,
Santiago,
Chile

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 902, Urb. Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto: 1 kg.**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
Entreguella o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
No permitir el ingreso de animales a las zonas tratadas.
No aplicar en época de floración del cultivo.

Sulfodin® 80% WG

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Sulfodin 80% WG es un acaricida inorgánico recomendado para el control de arañaña en mandarina y palto además de oidium en pimiento y vid.
El producto se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar una pre-mezcla diluyendo el producto en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVOS | PLAGAS | | DOSIS | | | PC* días | LMR** (ppm) |
|-----------|----------------|----------------------------|-------|-----------|--------|----------|-------------|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | Kg/ha | %*** | Kg/cil | | |
| Mandarina | Arañaña roja | <i>Panonychus citri</i> | -- | 0.25 | 0.5 | N.R. | N.R. |
| Pimiento | Oidium | <i>Leveillula taurica</i> | 1.5-2 | 0.375-0.5 | 0.75-1 | N.R. | N.R. |
| Vid | Oidium | <i>Erysiphe necator</i> | -- | 0.5 | -- | N.R. | N.R. |
| Palto | Arañaña marrón | <i>Oligonychus punicea</i> | -- | -- | 1 | N.R. | N.R. |

* PC=Periodo de carencia (en días) ** LMR=Límite máximo de residuos (en ppm)

N.R.: No requiere

*** % = concentración válida sólo para aplicaciones con pulverizadora manual de mochila.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicaciones de acuerdo a poblaciones de plaga en el cultivo. Se recomienda realizar hasta 5 aplicaciones por campaña.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados. Puede ser perjudicial si se aplica a temperaturas mayores de 30°C.
Realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos recomendados ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser empleado en mezcla con otros plaguicidas excepto con aceites de petróleo.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



© = Marca Registrada del grupo Bayer