

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

BENOMAX 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)


COMPOSICIÓN:

Benomyl 500 g/Kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. N° 046 - SENASA



Titular del registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: (01) 499 7831



Formulado por: POINT AGRO-CHINA Ltd
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China.
Tel. (86-510)80618101



Importado y distribuido por: POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018 / 349 9609

Contenido Neto: 1 Kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Benzimidazole
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de emergencias llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106;
INAP S.A.C. (01) 499 7831**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- No arrojar envases vacíos o residuos en fuentes de agua.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar a menos de 5 m de fuentes de agua.
- Tóxico para abejas. No aplicar en época de floración.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BENOMAX 50 PM es un fungicida sistémico, que al ser aplicado sobre el follaje es traslocado por la savia hacia toda la planta, al ser aplicado a las raíces, estas lo absorben y lo traslocan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor. Para semillas, sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

BENOMAX 50 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad.

Número máximo de aplicaciones: 3/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BENOMAX 50 PM es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

BENOMAX 50 PM no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/ha		
Melocotón	Oidium	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	500*	14	15

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

* Volumen de gasto de agua: 400L/Ha

