

Amalfi[®]₇₃

Amalfi[®]₇₃

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE PM

Composición Química

Benalaxil	80 g/Kg
Mancozeb	650 g/Kg
Aditivos	270 g/Kg

Reg. PQUA N° 015 - SENASA

Importado y Distribuido por:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.

Formulado por:

FMC

FMC Corporation Agricultural Products Group
Via Felice, Casal 20-Milano, Italia,
Bajo patente de:
FMC Corporation Agricultural Products Group
Philadelphia, Pennsylvania, USA

Titular del Registro
**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.**
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono: 710-4030

Contenido Neto: 1 Kg
Lote:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMALFI 73 muestra actividad fungicida principalmente sobre los Peronosporales de los géneros *Phytophthora*, *Peronospora* y *Bremia*. El componente principal del AMALFI 73, el benalaxil, puede ser absorbido por las yemas, hojas, tallos herbáceos y raíces de las plantas perennes y anuales.

AMALFI 73 actúa en el interior de los diversos órganos vegetales. Además de ser eficaz contra los órganos de multiplicación del patógeno en el exterior del vegetal, AMALFI 73 penetra por los tejidos epidérmicos, se mueve a través de las paredes celulares y es transportado vía xilema a todo el vegetal, llegando y protegiendo a las zonas no alcanzadas directamente por el producto o las que se forman después del tratamiento.

FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar el producto con la mitad del agua a utilizar a las dosis indicadas en el cuadro de usos y dosis, agitar, completo el agua y volver a agitar.

Realizar una aplicación con gotas finas y cobertura uniforme, durante las horas de menor viento y de preferencia en horas de la tarde.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar los tratamientos cuando las condiciones sean favorables para la infección y repetir con los intervalos después de una evaluación, considerando las condiciones ambientales existentes y el grado de infección.

PERÍODO DE REINGRESO

Evitar ingresar 1 a 2 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

AMALFI 73 es compatible con los insecticidas, fungicidas y nematodos de uso común, sin embargo estos últimos se debe aplicar a la mezcla inmediatamente antes de tratar.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y no ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No usar el envase vacío para conservar alimentos o agua potable.
- Revisar bien los equipos de aspersión antes de la aplicación para evitar fugas o golpes que puedan producir intoxicación en el aplicador.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento para la epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No puede ser empleado en ambientes cerrados, como invernaderos.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroidea o estén bajo tratamiento de infecciones tiroideas.

NOTA AL MÉDICO

El antídoto es desconocido. Aplicar terapia sintomática. Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroidea.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040
Alo ÉaSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reusar o depositar el contenido en otros envases.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, arroyos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- No aplicar a menos de 1-2 m de fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Científico	Nombre Común			
Papa	<i>Phytophthora infestans</i>	Hielo o Mancha	2-3	28	1
Tomate	<i>Phytophthora infestans</i>	Hielo o Mancha	2-3	28	1
Cebolla	<i>Peronospora destructor</i>	Mildiu	1-2	28	1
Lechuga	<i>Bremia lactucae</i>	Mildiu	1.5-2	28	1

P.C. Período de Cuarenta;

LMR: Límite Máximo de Residuo.

