Amalfi 73®

Amalfi 73®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - PM

Composición:

Benalaxil	80 g/Kg
Mancozeb	650 g/Kg
Aditivos	270 g/Kg

Reg. PQUA Nº 015 - SENASA

Importado y Distribuido por:

QSI

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

Contenido Neto: 1 Kg

Formulado por:

FMC

FMC Corporation Agricultural Products Group
Via Felice, Casati 20-Milano. Italia.
Bajo patente de :
FMC Corporation Agricultural Products Group
Philadelphia, Pennsylvania. USA

Titular del Registro

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria. Lima - Perú
Telef.: 710-4000

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMALFI 73 muestra actividad fungicida principalmente sobre los Peronosporales de los géneros Phytophthora, Peronospora y Bremia. El componente principal del **AMALFI 73**, el benalaxil puede ser absorbido por las yemas, hojas, tallos herbáceos y raíces de las plantas perennes y anuales.

AMALFI 73 actúa en el interior de los diversos órganos vegetales. Además de ser eficaz contra los órganos de multiplicación del patógeno en el exterior del vegetal, **AMALFI 73** penetra por los tejidos epidérmicos, se mueve a través de las paredes celulares y es transportado vía xilema a todo el vegetal, llegando y protegiendo a las zonas no alcanzadas directamente por el producto o las que se formen después del tratamiento.

FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar el producto con la mitad del agua a utilizar a las dosis indicadas en el cuadro de usos y dosis, agite, complete el agua y vuelva a agitar.

Realizar una aplicación con gotas finas y cobertura uniforme, durante las horas de menor viento y de preferencia en horas de la tarde.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar los tratamientos cuando las condiciones sean favorables para la infección y repetir con los intervalos después de una evaluación, considerando las condiciones ambientales existentes y el grado de infección.

PERIODO DE REINGRESO

Evitar ingresar 1 a 2 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

AMALFI 73 es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común, sin embargo estos últimos se debe añadir a la mezcla inmediatamente antes de tratar.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y no ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No usar el envase vacío para conservar alimentos o agua potable.
- Revisar bien los equipos de aspersión antes de la aplicación para evitar fugas o goteo que puedan producir intoxicación en el aplicador.
- El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento para la epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No puede ser empleado en ambientes cerrados, como invernaderos.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ditiocarbamato, Acylalanine
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
Contradicciones: Alcohol, aceites y grasas.

NOTA AL MÉDICO

El antídoto es desconocido. Aplicar terapia sintomática. Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

Teléfonos de emergencia:

Infosalud: 0800-10-828

EsSalud: 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar a menos de 1-2 m de fuentes de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	1 - 2	28	0.02
Lechuga	Mildiu	*Bremia lactucae*	1,5 - 2	28	1
Papa	Hielo o Rancha	*Phytophthora infestans*	2 - 3	28	0.02
Tomate	Hielo o Rancha	*Phytophthora infestans*	2 - 3	28	0.2

P.C. Periodo de Carencia. L.M.R. Limite Máximo de Residuos.