

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Inorgánicos**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428**  
**CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-800 ANEXO 4**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 horas después de la aplicación.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# PANTERA 80 WP

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN:**

Azufre ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 021 - SENASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



**FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.**  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

**Contenido Neto:**  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PANTERA 80 WP** es un fungicida-acaricida formulado en polvo mojable para el control de oidium y ácaros (arañita roja y ácaro del tostado) contemplado en el cuadro de usos. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar. Aplicar **PANTERA 80 WP** en mezcla con un volumen suficiente de agua de manera uniforme al follaje de las plantas. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar con agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA/ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1(*)	-	N.A.	N.A.
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.75 - 1	-	N.A.	N.A.
Mango	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75 - 1	-	N.A.	N.A.
	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	0.5 - 1	-	N.A.	N.A.
Palto	Arañita roja	<i>Oligonychus peruvianus</i>	0.5 - 0.75	-	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.5 - 0.7	-	N.A.	N.A.
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	1.5	N.A.	N.A.
Limón	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1 - 2	-	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm N.A.: No aplica  
(\*) Volumen total de caldo de aplicación: 2912 L/ha para el cultivo de mandarina

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación de la plaga para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones.

Para el cultivo de pimiento se recomienda 5-6 como número máximo de aplicaciones por campaña en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo. Para el cultivo de mandarina se recomienda realizar una aplicación por campaña (1 campaña/ año).

**PERIODO DE REINGRESO:**

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben mezclar bajo ningún motivo. No aplicar aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:**

**PANTERA 80 WP** no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

