

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Amidas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- El producto es nocivo por ingestión contacto con la piel y por inhalación.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX : 0800-1-3040  
CISPROQUIM : 0800-50847

**Nota al médico:**

Se recomienda usar absorbentes como carbón activado. Puede generar cianuro de hidrogeno, en caso de observar sintomatología, administrar nitrato de amilo u otro antídoto específico disponible.

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado: enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Devuelva este envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración del cultivo objetivo o cultivos colindantes.
- No aplicar a menos de 5m de fuentes de agua.

# Recargador<sup>®</sup>

## 50 SL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS  
DE USO AGRICOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICION QUIMICA:**

Cianamida Hidrogenada..... 500 g/l  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Reg.PQUA N° 031- SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**Point Andina S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15 Urb. Santa Patricia  
Ii Etapa.La Molina, Lima 12 - Perú.  
Teléfono 348-1018 / 349-9609



**FABRICADO y FORMULADO POR:**

**FLAGCHEM Jiansu flag Chemical Industry Co., Ltd.**  
Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park  
Luhe, Nanjing, China

**IMPORTADO y DISTRIBUIDO POR:**

**Point Andina S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**RECARGADOR 50 SL** es un regulador de crecimiento de plantas destinado para ser usado en el cultivo de vid; el cual necesita horas de frío para tener una adecuada producción. Ante la falta de un invierno muy frío en nuestro país, **RECARGADOR 50 SL**, actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas, estimulando así una brotación de yemas homogénea y abundante.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas, y directamente sobre los cargadores para el caso de vid. Utilizar equipo de aspersión manual.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS**

| Cultivo | DOSIS |           |
|---------|-------|-----------|
|         | lt/ha | lt/200 Lt |
| VID     | 10.0  | 5.0       |

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:-** En vid, aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, las aplicaciones deben ser dirigidas sobre los sarmientos o ramas con yemas productivas. Efectuar una aplicación por campaña agrícola.

**PERIODOS DE REINGRESO:-** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD.-** No mezclar con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas, siendo compatible con surfactantes no iónicos.

**FITOTOXICIDAD-** No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.-** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.