

37x16cm

DK-CLOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN

Butachlor 600 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA Nº 097- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar. Lima - Perú
Lima - Perú. Telf.: 501-1000



FORMULADOR: EASTCHEM CO., LTD
Floor 26, Haoyuan Mansion, N° 266, Middle Tongjiang Road
Changzhou, Jiangsu, P.R. China.
Teléfono

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de Formulación :
Número de Lote :
Contenido neto : 4 L
Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“ LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es irritante ocular y sensibilizante de la piel. Es nocivo por ingestión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Chloroacetamide.
- En caso de ingestión beber bastante agua, realizar lavado gástrico bajo supervisión médica y no inducir el vómito. lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación alejarlo de la zona contaminada y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- NOTA AL MEDICO: No existe antídoto establecido, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencias llamar a SAMU. Telf.: 106, DROKASA PERU S.A Telf.: (01) 501-1000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración, peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar que la deriva de aplicación alcance a los cultivos no objetivo.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga los animales fuera del área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



COD. 1303007-VI



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-CLOR es un herbicida selectivo y pre-emergente. Controla un amplio rango de malezas gramíneas y ciperáceas anuales y algunas especies de hoja ancha en arroz.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Realizado el trasplante aplique DK-CLOR después de desaguar las pozas y de preferencias antes que las malezas hayan alcanzado el estado de 2 hojas verdaderas. Después de esta etapa, el grado de control disminuye.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | M A L E Z A S | | DOSIS L/ha | PC días | LMR ppm |
|---------|--|--|------------|---------|---------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| Arroz | Moco de pavo Rabo de zorro Campanilla Cadillo | <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Setaria geniculata</i> <i>Ipomoea crassifolia</i> <i>Cenchrus echinatus</i> | 4 - 5 | 42 | 0.5 |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación de DK CLOR un día después del trasplante o siembra.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

Fitotoxicidad: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD

DK-CLOR es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.