

DK-CLOR

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE -EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Butachlor 600 g/L
- Aditivos 80 g/L
- Solvesso 100 C.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 097- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.
Teléfono: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road
750#, Jinan, Shandong - China

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 10 Litros

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es irritante ocular y sensibilizante de la piel. Es nocivo por ingestión.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, beber abundante agua, realizar lavado gástrico bajo supervisión médica y no inducir el vómito. Lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, alejarlo de la zona contaminada y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. solicite atención medica inmediata.
- NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto establecido, dar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.: 423-7600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración
- Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.-
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar que la deriva de aplicación alcance a los cultivos no objetivo.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga los animales fuera del área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-CLOR, es un herbicida selectivo y pre-emergente. Controla un amplio rango de malezas gramíneas y ciperáceas anuales y algunas especies de hoja ancha en arroz.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Realizado el transplante, aplique DK-CLOR después de desaguar las pozas y de preferencia antes que las malezas hayan comenzado a emerger, o máximo cuando estas hayan alcanzado el estado de 2 hojas verdaderas. Después de esta etapa, el grado de control disminuye.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación de DK-CLOR un día después del transplante o siembra.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa en las dosis y el cultivo recomendado.

COMPATIBILIDAD

DK-CLOR, es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS Y USOS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
Arroz	Moco de pavo Rabo de zorro Campanilla Cadillo	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Setaria genniculata</i> <i>Ipomoea crassifolia</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	4 - 5	2 - 2.5	42	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

