

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX : 0800-1304
Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.: 01 422 5900

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

FORTIS[®] 10CE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION QUIMICA:

Alfacipermetrina..... 100 g/l
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°108-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:



INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C
Av. Nicolas Arriola N° 1457
La Victoria, Lima - Perú.
Tel.: (01) -422-5900

FORMULADO POR:

Nantong Dading Chemical Co., LTD
N°1 Tonghai Road,
Rudong Yankou
Chemical Industri Zone
Tel.: +86 (0) 513-81903406

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



BIOAGROCORP TRADING S.A.C
Calle Los Flamentos N°121. Interior 6. Santa Anita
Lima 43 - Perú
Telf.: 4782002, Anexo 605

CONTENIDO NETO: 1L

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORTIS 10CE es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por mas de 12 horas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

Cultivos	Plaga		Dosis ml/200 L	Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Alfalfa	Gusano ejercito	<i>Prodenia spp.</i>	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0,05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN. - Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas.

Numero máximo de aplicaciones: 4 campaña /año

PERIODO DE REINGRESO. - Como mínimo 24 horas.

COMPATIBILIDAD. - No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD. - No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL. - El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

