

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Forum® 500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Dimethomorph.....
500 g/kg
Aditivos.....
c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 112 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO POR:

BASF Peruana S. A.

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao Casilla 3911, Lima
100 Telf.: (01) 513 2500 Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR: BASF Corporation

26 Davis Drive, PO BOX 13528 Research Triangle Park
NC 27709-3528 Estados Unidos de Norteamérica

DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú Telf.: (01) 501-1000

BASF

We create chemistry



CONTENIDO NETO: 120 g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

®Marca Registrada BASF

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

<p>LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"</p> <p>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puede perjudicar a la fertilidad. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. <p>INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Grupo químico: morfollinas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En caso de intoxicación llame inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de inhalación: Conducir a la víctima hacia un lugar con aire fresco. Buscar atención médica. - En caso de contacto con los ojos: No usar colirio. Buscar atención médica. Lavar con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos. - En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón durante 5 minutos. - En caso de ingestión: No provocar el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. <p>Indicaciones para el médico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De acuerdo con los síntomas recurrir al tratamiento sintomático. <p>TELEFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847 BASF Peruana S.A.: 513 2505</p> <p>CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. - Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión <p>MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros. - El aplicador deberá de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - No permitir animales en el área tratada. 	<p>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO Forum®500 WP (dimethomorph) del grupo químico de las morfollinas, actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomicetos como la racha o hiello y el mildiu. Forum®500 WP tiene acción translaminar (pasa de un lado a otro de las hojas) y sistémica hacia las partes superiores de la planta (brotes). Grupo FRAC 40.</p> <p>No aplicar Forum®500 WP solo sino en mezcla con fungicidas de contacto como metiram, mancozeb, chlorotalonil, etc.</p> <p>Se puede aplicar con pulverizadores de mochila, motopulverizadoras o equipos accionados por tractores.</p> <p>Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con agua, Forum®500 WP y el fungicida acompañante. Llène el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.</p> <p>CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cultivo</th> <th colspan="2">Plaga</th> <th colspan="2">Dosis</th> <th rowspan="2">PC* (días)</th> <th rowspan="2">LMR** (ppm)</th> </tr> <tr> <th>Nombre común</th> <th>Nombre científico</th> <th>Kg/ha</th> <th>g/200 L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Papa</td> <td>Ranchar o hiello</td> <td><i>Phytophthora infestans</i></td> <td>0.36-0.40</td> <td>150-200</td> <td>14</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Cebolla</td> <td>Mildiu</td> <td><i>Peronospora destructor</i></td> <td>0.36-0.40</td> <td>150-200</td> <td>14</td> <td>0.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>*PC = Periodo de carencia **L.M.R. = Límite máximo de residuos</p> <p>FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN Aplicar Forum®500 WP en forma preventiva ante condiciones medioambientales favorables para el desarrollo del hongo o ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se conozca la susceptibilidad de las variedades cultivadas.</p> <p>Las aplicaciones deben de formar parte de un manejo integrado del cultivo. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días, hacer rotaciones con productos sistémicos de diferente modo de acción y diferente grupo químico para evitar la aparición de la resistencia del hongo.</p> <p>PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de realizada la aplicación</p> <p>COMPATIBILIDAD: Forum®500 WP se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.</p> <p>FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.</p> <p>RESPONSABILIDAD CIVIL El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.</p>	Cultivo	Plaga		Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	g/200 L	Papa	Ranchar o hiello	<i>Phytophthora infestans</i>	0.36-0.40	150-200	14	0.05	Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.36-0.40	150-200	14	0.60
Cultivo	Plaga		Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)																				
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	g/200 L																						
Papa	Ranchar o hiello	<i>Phytophthora infestans</i>	0.36-0.40	150-200	14	0.05																				
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.36-0.40	150-200	14	0.60																				
																										

ETIQUETA PARA USO