



Antracol®

70% PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Propineb, 700 g/Kg
Inertes, 300 g/kg

Reg. N° 043-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.

Fabricado por:

Bayer S.A.
A.A 80004
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**¡NO EXPLOSIVO! ¡NO INFLAMABLE!
¡NO CORROSIVO!**

**Contenido
Neto:**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG / Alemania

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) deben emplearse máscara, guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar. Terminada la labor, lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. Almacenarlo en su envase herméticamente cerrado en lugares adecuados, lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), forrajeros, medicinas y bebidas. No es tóxico para abejas.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar el vómito si el paciente está consciente, repetir hasta que el vómito fluya claro. Dar de beber mucha agua (ni leche ni alcohol ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón medicinal en 150-200 ml de agua cada 4-6 horas hasta la mejoría del paciente.
Si se ha inhalado, alejar al paciente del área contaminada a un lugar fresco y ventilado; son eficaces las inhalaciones de manzanilla. Mantenerlo en reposo. Si se han contaminado los ojos lavar con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha entrado en contacto con la piel, quitar la ropa y lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos.
Por aspiración y por contacto, se observan casos de rinitis; faringitis; bronquitis; dermatitis y conjuntivitis.
INDICACIONES PARA EL MEDICO : Se recomienda tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: No se ha determinado un antídoto específico.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN :
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-5-0847
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :
"Después de usar el contenido de este envase, destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases".
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

USO ESPECIFICO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

I. Como fungicida de aspersión

Cultivo	Enfermedad		Dosis			P.C.* (días)	L.M.R.** (ppm)
	Nombre común	Agente Causal	Kg/ha	kg/cil 200 l	%		
Algodonero	Mancha negra de la hoja	Alternaria tenuis	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	3
Aji		Cercospora capsici				7	1
Haba		Cercospora fabae				7	0.5
Papa, Tomate	Hielo fungoso	Phytophthora infestans	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	0.1
Sandía	Mildiu	Pseudoperonospora cubensis	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	1
Melón						7	0.5
Zapallo						7	0.2
Melón	Mancha de la hoja	Alternaria spp.	1.5-2.5	0.5-0.6	0.25-0.30	7	0.5
Naranja	Podredumbre gris de las flores	Botrytis cinerea	3.6	0.5-0.6	0.25-0.30	7	2
Vid						7	5
Fresa						7	3
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	1.5-3.0	0.5-0.6	0.25-0.30	30	2
Arroz	Mancha carmelita	Helminthosporium oryzae	1.5-2.0	-	-	7	0.05
Esparrago	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	2.0	1	0.5	N.d	0.05
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	-	0.25	N.d	0.05
Cebolla	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	1.5	0.5	-	7	0.05

* PC = Periodo de carencia (en días) **LMR = Límite máximo de residuos (en ppm) N.d = No determinado

II. Como desinfectante de semilla

Cultivo	Enfermedad	Agente causal	Dosis
Arroz	Manchado de la semilla y Manchado de la hoja Manchado de la semilla y Mancha carmelita Manchado de la semilla y Podredumbre del tallo	Trichoconis padwickii, Curvularia sp., Alternaria sp, Helminthosporium oryzae Fusarium sp.	2 gr por 1 Kg de semilla ó 200 gr por 100 Kg de semilla

