

BENOPOINT 50 PM[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP


COMPOSICIÓN QUÍMICA

- **Ingrediente activo:**
Benomyl.....500 g/Kg
 - **Ingredientes inertes**500 g/Kg
- TOTAL 1000 g/Kg

Reg. N° 868-99-AG-SENASA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



TITULAR DEL REGISTRO: PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 / Telefax 348-9609

FABRICANTE: Point Agro China Ltd

Room 1505-1506, Dinamond Business Center
Nanxing Street, Shangchen Distric
Hangzhou, China

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Carlos Alayza y Roel 2180 - Lince
Telf.: 470-1111 Fax: 470-3154



NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

® Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito.
- No dar de beber nada a una persona que se encuentra inconsciente.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0 800 - 1 3040 (Atención 24 horas)

ESSALUD: 411-8000

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

No contamine las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

BENOPOINT 50 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetirse la aplicación entre 7 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BENOPOINT 50 PM es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

BENOPOINT 50 PM no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/ha	g/200L		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	200	0	5
Alcachofa	Viruela	<i>Romularia cinerea</i>	0.4	200	0	5
Apio	Viruela del apio	<i>Septoria apii</i>	0.5	200	7	3
Cebolla	Podredumbre blanda	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.5	200	7	2
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	200	0	5
Frijol	Antracnosis	<i>Sclerotinia sp</i>	1	500	14	2
Manzano	Sarna del manzano	<i>Venturia inaequalis</i>	1	200	30	7
Melocotón	Oidio	<i>Oidium sp</i>	1	250	14	15
Melón	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4	200	5	1
Tomate	Viruela del tomate	<i>Septoria lycopersici</i>	0.6	200	5	5
Vid	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	1	200	7	10
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	200	0	5

DESINFECCION DE SEMILLAS:

Papa	Costra negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	100 g/100L/TM	14	3
-------------	--------------	---------------------------	---------------	----	---

LMR: Limite máximo de residuos en partes por millón

