

BENOPOINT 50 PM[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Contenido Neto : 200 gramos

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

COD. 571351

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE DOSIFICACIONES Y USOS

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS		Periodo de Carenzia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200 L		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	200	0	5
Alcachofa	Viruela	<i>Ramularia cinerea</i>	0.4	200	0	5
Apio	Viruela del apio	<i>Septoria apii</i>	0.5	200	7	3
Cebolla	Podredumbre blanda	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.5	200	7	2
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	200	0	5
Frijol	Antracnosis	<i>Sclerotinia sp</i>	1	500	14	2
Manzano	Sama del manzano	<i>Venturia inaequalis</i>	1	200	30	7
Melocotonero	Oidio	<i>Oidium sp</i>	1	250	14	15
Melón	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4	200	5	1
Tomate	Viruela del tomate	<i>Septoria lycopersici</i>	0.6	200	5	5
Vid	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	1	200	7	10
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	200	0	5

DESINFECCION DE SEMILLAS:

Papa	Costra negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	100 g/100L/TM	14	3
------	--------------	---------------------------	---------------	----	---

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia.

NOTA AL COMPRADOR

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para su uso se debe tener en cuenta la siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito.
- No dar de beber nada a una persona que se encuentra inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 0 800 - 1 3040 (Atención 24 horas) ESSALUD: 423-7600

BENOPOINT 50 PM[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Benomyl 500 g/kg
Aditivos 500 g/kg
TOTAL 1000 g/kg

TITULAR DE REGISTRO:

PINERAL ANDINA S.A
Av. Flora Tristan 463 Ofc 102, Sta Patricia II Etapa
La Molina- Perú. Telef: 348 - 10 18

FABRICADO Y FORMULADO POR:

POINT AGRO - CHINA LIMITED
Room 1505 - 1506, Diamond Business Centre
Nanxing Street,
Shangcheng District,
Hangzhou 310008.China
© Marca Registrada

Reg. Nº 868 - 99 - AG - SENASA
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio Nº 150 piso 7
Miraflores. Telf.: 219-3901
Fax: 219-3929.



NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
No contamine las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

BENOPOINT 50 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, puede repetirse la aplicación entre 7 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BENOPOINT 50 PM es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

BENOPOINT 50 PM no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido Neto : 200 g

