

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Durante la aplicación usar máscara y guantes protectores, no comer, beber ni fumar.
-Terminada la labor, lavarse y cambiarse de ropa. Mantener alejados a los niños y animales domésticos del lugar de la aplicación.
-No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. No verter los restos de la mezcla sobre cultivos útiles (alimenticios, forrajeros) y fuentes de agua (lagos, ríos, estanque, acequias) para evitar su contaminación.
-Usarlo sólo de sus envases originales y almacenarlos herméticamente cerrados en lugares frescos y ventilados, cerrados bajo llave, lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
-No se debe almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, (frescos o en conservas), medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazoles
-Si se presentaran síntomas de intoxicación, acudir de inmediato al médico.
-Entretanto, cambiar de ropa al paciente, lavar las partes expuestas al contacto con el producto; hacerlo reposar en un ambiente fresco. Si la intoxicación es por ingestión provocar el vómito.
-Hacer un lavado gástrico con una suspensión de carbón medicinal (2-3 cucharadas en medio litro de agua).

Indicación para el médico:

El médico instituirá un tratamiento sintomático.

Antídoto:

No se ha determinado un antídoto específico. El médico instituirá un tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 **CISPROQUIM:** 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
-Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.



Folicur®
250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Emulsión Aceite en agua (EW)

Composición:
Tebuconazole, 250 g/l
Aditivos, csp 1 litro
Reg.Nro:460-97-AG-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima - Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 1 litro

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Folicur 250 EW, es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles con acción preventiva, curativa y erradicativa.
Forma de empleo: Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua.

USO ESPECÍFICO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
			l/ha	%	ml/cil		
Arroz	Quemado	<i>Piricularia oryzae</i>	1	0.2 - 0.3 con atomizadora de mochila de 12 litros	400-600	35	1
Cebada	Roya de la hoja	<i>Puccinia hordei</i>	0.5-0.75	-	-	35	0.2
Cítricos Naranja	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.1	200	21	0.9
Cucurbitáceas Melón Sandía Zapallo	Oídiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	-	0.04	80	14	0.15
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.1	200		
Fresa	Oídiosis	<i>Oidium sp.</i>	-	0.04	80	5	0.02
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.1	200		
Frijol	Oídiosis	<i>Erysiphe polygoni</i>	0.75-1	0.02-0.04	40-80	21	0.1
Frijol Vainita	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	0.5 - 0.75	0.05-0.075	100-150		
Manzano	Oídiosis	<i>Podosphaera leucotricha</i>	-	0.04	80	14	0.05
Melocotonero	Oídiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	-	0.05	100	21	0.6
Ornamentales Clavel	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.1	200	n.a	n.a
Vid	Oídiosis	<i>Uncinula necator</i>	-	0.03-0.1	60-200	21	2
Espárrago	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.1	200		
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5	0.05	100	30	0.01
Pimiento	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	0.1-0.125	200-250	14	0.5

*PC = Período de Carenia **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm) N.a = No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar el producto como máximo 02 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año, previa evaluación de la presencia de la enfermedad, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

INCOMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

