

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Conserve el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Durante la mezcla usar guantes protectores.
- Durante la aplicación usar guantes y máscara protectora.
- No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo.
- Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien y cambiarse de ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Piretroides.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua. Dilúyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente
- En caso de inhalación, se recomienda reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- Tras contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Este producto es tóxico para peces, por lo tanto no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. Tóxico para abejas, no aplicar en época de floración.

POUNCE®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición química:
 Permethrin 384.7 g/L
 Aditivos 540.3 g/L

Reg. Producto N° 083-96-AG-SENASA

Titular del Registro: FMC Latinoamerica S.A. Sucursal

Fabricante y Formulator:

FMC Corporation
 Agricultural Products Group
 1735 Market Street - Philadelphia, PA 19103 - USA



Importador
FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



Fecha de Formulación:
 Fecha de vencimiento:
 N° de lote:
 Contenido neto: 1 L.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

El insecticida **POUNCE** es un piretroide sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se llena con agua (volumen/ hectárea, de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en todo caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de **POUNCE**, completando luego la capacidad del recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable, lista para ser aplicada.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/ha.	mL/200 L		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 120	50 - 60	7	0.05
TOMATE	Gusano del fruto del Tomate	<i>Prodenia eridania</i>	100 - 120	50 - 60	7	0.05
	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>				
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	120 - 160	60 - 80	n.d.	0.05
	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>		80 - 150		
PIMIENTO	Gusano perforador	<i>Spodoptera eridania</i>	200 - 400	80 - 150	n.d.	0.05
	Gusano perforador del fruto	<i>Symmetrichema capsicum</i>				
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		100 - 150	1	0.05

P.C. = Periodo de carencia en días; L.M.R. = Limite máximo de residuos en ppm; n.d. = No disponible

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas.

COMPATIBILIDAD:

POUNCE es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. La mezcla debe hacerse en el tanque de aplicación y aplicarse el mismo día.

FITOTOXICIDAD:

POUNCE no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

