PRECAUCIONES, Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Deber ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- · Durante la mezcla usar guantes protectores.
- Durante la aplicación usar guantes y máscara protectora.
- · No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo.
- Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien y cambiarse de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo químico: Piretroides
- En caso de ingestión; enjuague la boca con agua. Diluyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente
- En caso de inhalación: Se recomienda reposo, respirar aire fresco. Buscar ayuda médica.
- Tras caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agúa corriente durante 15 minutos y con los parpados abiertos.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antídoto especíco. Tratamiento Sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN CISPROQUIMº: 080-050-847 FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811 SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superciales o en suelos altamente permeable.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

POUNCE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

 Composición:
 384.7 g/L

 Permethrin
 384.7 g/L

 Aditivos
 csp 1L

 Reg. N° 083-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamerica S.A. Sucursal

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas nº 208, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Formulador: FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO # 112

Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento Nº de lote:

NO CORROSIVO

Contenido Neto: 1 L

INFLAMABLE

MPORTADOR Farmagro S.A.,

® Marca registrada de FMC.

Importado y distribuido por: FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El insedicida **POUNCE** es un piretroide sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

Preparación de la mezcla: Se llena con agua (Volumen/hectárea, de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en toto caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de POUNCE, completando luego la capacidad de recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable. Iista para ser aplicada.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

3 3						
CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC.	L.M.R.
	Común	Técnico	mL/ha.	mL/200 L	(dias)	(ppm)
PAPA	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	100 - 120	50 - 60	7	0.05
TOMATE	Gusano del fruto del Tomate	Prodenia eridania	100 - 120	50 - 60	7	1
	Pollilla	Tuta absoluta				
ALCACHOFA	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	120 - 160	60 - 80	N.A.	5
	Gusano defoliador	Spodoptera eridania		80 - 150		
PIMIENTO	Gusano perforador	Spodoptera eridania		80 - 150	N.A.	0.5
	Gusano perforador del fruto	Symmestrichema capsicum	200 - 400			
CEBOLLA	Thrips	Thrips tabaci		100 - 150	1	0.1

P.C.= Periodo de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; N.A.= No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

PERIODO DE REINGRESO:

24 Horas.

COMPATIBILIDAD:

POUNCE es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. La mezcla debe hacerse en el tanque de aplicación y aplicarse el mismo día.

FITOTOXICIDAD:

POUNCE no presenta efectos totóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es efficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

E_RT - Rev.02 - 2




MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



29/06/2021 13:20:45

RT Pounce 1 L Rev02 PE (Distr. Farmagro_Form. Farmagro).indd

Tamaño de Pictogtamas: 7 x 7 mm



Alterações: Nueva Etiqueta para Formulador Farmagro (24/06/21 - Ana)