"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Lea la etiqueta detenidamente antes de usar el producto.
- Almacenar bajo llave en ambiente seco, ventilado y separado de la casa habitación. No almacene por períodos prolongados donde la temperatura excede los 46º C.
- Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Evite respirar el rocío, no fumigue contra el viento.
- Use overol, guantes de jebe, botas, gorra y máscara para su manipuleo.
- Inmediatamente después de su aplicación, lave la ropa protectora, báñese con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber durante la aplicación.
- Mantenga el producto bien tapado en su envase original, retirado de alimentos, calor, fuego, lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- No contamine el agua, lavando el equipo o eliminando desechos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Acuda de inmediato al médico, hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, lavar las partes expuestas al contacto, abrigarlo bien.
- Si se ha contaminado la piel, lavar con abundante agua y jabón.

Al contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

- Se debe retirar las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- No se debe utilizar solventes.
- En casos de ingestión oral se da de beber mucha agua (¡Ni leche ni alcohol!) y una suspensión de 10 mg o más de carbón medicinal en 150-200 ml de agua cada 4-6 horas hasta la mejoría del paciente.
- Se debe tener mucho cuidado en inducir al vómito (lo cual se debe hacer si el producto químico tragado es altamente tóxico y cuando no se dispone rápidamente de asistencia médica), ya que se corre el peligro de aspirar el solvente, lo que puede producir neumonía o neumonitis.
- El vómito sólo se debe inducir en personas que se encuentren perfectamente lúcidas.
- Se puede inducir al vómito dando 1 cucharada de jarabe de Ipecacuana.
- Se debe dar a beber mucho líquido (varios litros en el curso de unas horas) para forzar la diuresis.
- En caso de agregarse bicarbonato de sodio a las infusiones , se deben seguir exactamente las instrucciones posológicas, porque existe el riesgo de depresión respiratoria.
- No se ha determinado un antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
SAMU: 106 SMTM PERÚ S.A.C: 01 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
- Tóxico a peces, aplicar lejos de fuentes de agua.

Sumicidin® 30 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Fenvalerato, 300g/L
Aditivos, csp 1 litro

Reg. N° 365-97-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
SMTM PERU S.A.C
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, TORRE III.
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco. Lima, Perú

FORMULADO POR:
Summit Agro International Ltd.
1-8-12, Harumi, Chuo-Ku, Tokyo
104-6223 Japón.

DISTRIBUIDO POR:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 San Isidro

CONTENIDO NETO: 1 L.
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sumicidin 30 EC es un insecticida órgano sintético de amplio espectro de acción, buena persistencia y acción inmediata.

Sumicidin 30 EC actúa por contacto e ingestión, paralizando el sistema nervioso del insecto, al actuar sobre la permeabilidad de las membranas de las terminaciones nerviosas, inmovilizándole y causándole la muerte al afectar el proceso respiratorio.

Mezcle la cantidad adecuada de **Sumicidin 30 EC** con agua limpia y revuelva hasta que quede completa la emulsión, no se debe almacenar el preparado de un día para el otro.

Los volúmenes promedio utilizados en aplicaciones terrestres están en 400 l/ha y para aplicaciones aéreas de 50 a 60 l/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC* (Días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/Ha	L/200L		
Algodón	Arrebiatado	*Dysdercus peruvianus*	0.500	0.250	15	0,2
Frijol	Barrenador de brotes Laspeyresia Gusano medidor de la hoja	*Crocidocema aporema* *Laspeyresia sp* *Chrysodeixis includens*	0.300 0.300 0.450	0.150 0.015 0.225	15	0,5
Tomate	Caballada	*Spodoptera eridania*	0.300	0.150	15	1,0
Alfalfa	Pequeño perforador de los terminales Caballada	*Epinotia sp.* *Anticarsia gemmatalis*	0.300-0.500 0.300-0.500	0.150-0.250 0.150-0.250	15	1,0

*PC = Periodo de Carencia (días) ** LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda en general aplicar cuando se presentan los primeros ataques de los insectos, en cualquiera de los cultivos en que se recomienda su uso.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los que tengan reacción alcalina (caldo bordalés, polisulfuro, etc).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico con los cultivos recomendados. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas". Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.