

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**Extrathion 57 EC** pertenece al grupo químico Fosforados.

- ⚠ No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- ⚠ Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- ⚠ No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajeados.
- ⚠ Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- ⚠ Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- ⚠ No aplicar el producto **Extrathion 57 EC** a menos de 40 metros de una fuente de agua.
- ⚠ No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras formas de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

**MANEJO DE ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si se ingiere, no inducir al vómito.

**ANTÍDOTO:**

Sulfato de Atropina.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**  
**CICOTOX: 0800 13040**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

Este producto es tóxico para peces, por lo tanto no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. Tóxico para abejas, no aplicar en floración.

# Extrathion<sup>®</sup>

## 57 EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**  
**Malathion 623 g/L**

Registro N° 390-97-AG-SENASA  
 R.U.C. N° 20100180210

Fabricante:  
**HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD**  
 Riverside wharf, Changhe Town, Hangzhou, Zhejiang Province, China.  
**CHINA**  
 Tel: (+86) 571 - 86624059

Formulador y Titular del registro:  
**FARMAGRO S.A.**  
 Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO S.A.**   
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS



**¡EXPLOSIVO!**

**NO CORROSIVO**



**¡INFLAMABLE!**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Extrathion 57 EC** es un insecticida organofosforado no sistémico con acción de contacto estomacal. Es utilizado en agricultura para el control de un amplio rango de insectos, plagas chupadoras masticadoras, en una gran variedad de cultivos, frutas y vegetales.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llenar con agua e tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **Extrathion 57 EC** recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

**“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/100 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Alfalfa	Palomilla	Epinotia aporema	300	7	n.d.
	Empoasca	Empoasca karaemeri			
Cebolla y Ajo	Thrips	Thrips tabaci	300	7	8
	Cogollero	Spodoptera frugiperda	300	7	2
Naranja	Mosca de la fruta. Agregar un Cebo atrayente a base de proteína hidrolizada al 0.4% (400 mL/100 L de agua).	Ceratitis capitata	400	7	8
	Querezas: Agregar un aceite agrícola al 0.5% de preferencia.	Anastrepha faterculus Lepidosaphis beckii			
Pimiento	Mosca de la fruta	Ceratitis capitata	400 - 500	3	8
Trigo, Arroz (Granos almacenados)	Picudo del arroz	Sitophilus oryzae	Directamente a los granos o semillas a razón de 250 mL ó 6 L de agua por tonelada.	n.d.	8
	Palomillas de los cereales	Sitophilus granarius			
	Barreno menor de los granos	Rhysopertha dominica	Directamente sobre los sacos 300 mL/100m <sup>2</sup> de superficie de sacos en 4 u 8 L de agua.		
Aplicación sobre granos:	Aplicar a cada nivel de sacos a medida que se van colocando y una vez terminada esta operación rocíese las partes superiores y costados de la fila de sacos.		50 mL agua. Tratamiento de la bodega de barcos: Sobre la harina ensacada úsese de 300 mL en 10L de agua para 100m <sup>2</sup> de superficie de sacos. Aplicación directa sobre harina de pescado		
Harina de pescado	Dermestes	Dermestes vulpinus	20 a 50 mL por Litro de agua	n.d.	8
Insectos	Pulgas chirimachas	Pulex irritans Triatoma infestans			

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; n.d.= No determinado

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplique al inicio del ataque de las plagas, use una frecuencia entre aplicación de 7 a 10 días.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **EXTRATHION 57 EC** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **EXTRATHION 57 EC** no presenta efectos fitotoxícos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**NOTA AL COMPRADOR:** “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**Ligeramente peligroso**  
**DAÑINO**

