

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplicar el producto **Extrathion 57% EC** a menos de 40 metros de una fuente de agua.
- No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras formas de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Extrathion 57% EC** pertenece al grupo químico Fosforados.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si se ingiere, no inducir al vómito.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.

**ANTÍDOTO:**

Sulfato de Atropina.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**  
**CICOTOX: 0800 13040**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

Este producto es tóxico para peces, por lo tanto no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. Tóxico para abejas, no aplicar en floración.

# Extrathion<sup>®</sup>

## 57% EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

Malathion 623 g/L  
 Aditivos csp 1L

Registro N° 390-97-AG-SENASA  
 R.U.C. N° 20100180210

Formulador y Titular del registro:

**FARMAGRO S.A.**  
 Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **1L**

Fecha de Vencimiento:



**¡INFLAMABLE!**



**¡EXPLOSIVO!**

**NO CORROSIVO**



© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Extrathion 57% EC** es un insecticida organofosforado no sistémico con acción de contacto estomacal. Es utilizado en agricultura para el control de un amplio rango de insectos, plagas chupadoras masticadoras, en una gran variedad de cultivos, frutas y vegetales.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llenar con agua e tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **Extrathion 57% EC** recomendado agitando bien y completar luego con más **"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/100 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Alfalfa	Palomilla	Epinotia aporema	300	7	n.d.
	Empoasca	Empoasca karaemeri			
Cebolla y Ajo	Thrips	Thrips tabaci	300	7	8
	Cogollero	Spodoptera frugiperda	300	7	2
Naranja	Mosca de la fruta. Agregar un Cebo atrayente a base de proteína hidrolizada al 0.4% (400 mL/100 L de agua). Quezazas: Agregar un aceite agrícola al 0.5% de preferencia.	Ceratitis capitata Anastrepha faterculus Lepidosaphis beckii	400	7	8
	Mosca de la fruta	Ceratitis capitata	400 - 500	3	8
Trigo, Arroz (Granos almacenados)	Picudo del arroz	Sitophilus oryzae	Directamente a los granos o semillas a razón de 250 mL ó 6 L de agua por tonelada.	n.d.	8
	Palomillas de los cereales	Sitophilus granarius			
Aplicación sobre granos:	Barreno menor de los granos	Rhysopertha dominica	Directamente sobre los sacos 300 mL/100m <sup>2</sup> de superficie de sacos en 4 u 8 L de agua.		
	Aplicación sobre granos: Aplicar a cada nivel de sacos a medida que se van colocando y una vez terminada esta operación rocíese las partes superiores y costados de la fila de sacos.			50 mL agua. Tratamiento de la bodega de barcos: Sobre la harina ensacada úsese de 300 mL en 10L de agua para 100m <sup>2</sup> de superficie de sacos. Aplicación directa sobre harina de pescado	n.d.
Harina de pescado	Dermestes	Dermestes vulpinus		n.d.	8
Insectos	Pulgas	Pulex irritans	20 a 50 mL por Litro de agua		
	chirimachas	Triatoma infestans			

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; n.d.= No determinado

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplique al inicio del ataque de las plagas, use una frecuencia entre aplicación de 7 a 10 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **EXTRATHION 57% EC** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **EXTRATHION 57% EC** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

